



ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ УРАВНЕНИЯ

И

ПРОЦЕССЫ УПРАВЛЕНИЯ

№ 3, 2003

Электронный журнал,
рег. № П23275 от 07.03.97

<http://www.neva.ru/journal>
e-mail: diff@osipenko.stu.neva.ru

Управление в нелинейных системах

УСТОЙЧИВОСТЬ ОДНОГО КЛАССА ФУНКЦИОНАЛЬНО-ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ В ПРОСТЕЙШЕМ КРИТИЧЕСКОМ СЛУЧАЕ С МОНОТОННОЙ ДИФФЕРЕНЦИРУЕМОЙ НЕЛИНЕЙНОЙ ХАРАКТЕРИСТИКОЙ

Н.В. КУЗНЕЦОВ

Россия, 198904, Санкт-Петербург, Петродворец, Библиотечная пл., д. 2,
Санкт-Петербургский государственный университет,
e-mail: nick@920.spb.ru

Аннотация.

С помощью анализа функций Ляпунова в виде форм четвертого порядка и метода усреднения получен новый частотный критерий устойчивости функционально-дифференциальных уравнений, описывающих динамику нелинейных импульсных систем в случае одного нулевого корня характеристического уравнения с монотонной дифференцируемой нелинейной характеристикой.

⁰Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 02-01-00542) и (проект № 01-01-00317).

1 Постановка задачи

Рассматривается система функционально-дифференциальных уравнений

$$\dot{z} = Az + bf, \quad \sigma = c'z, \quad (1)$$

$$f = N\sigma, \quad (2)$$

где A — постоянная $m \times m$ -матрица, все собственные значения которой, кроме одного нулевого, лежат в левой полуплоскости, b и c — постоянные m -мерные столбцы, N — нелинейный оператор, который каждой непрерывной на $[0, +\infty)$ функции $\sigma(t)$ ставит в соответствие функцию $f(t)$ и последовательность $\{t_n\}$ ($n = 0, 1, 2, \dots$; $t_0 = 0$), обладающие следующими свойствами:

а) функция $f(t)$ кусочно-непрерывна на каждом промежутке $[t_n, t_{n+1})$ и не меняет знака на нем;

б) при $n = 0, 1, 2, \dots$ справедливо неравенство

$$\delta_0 T \leq t_{n+1} - t_n \leq T, \quad (3)$$

где $T > 0$, $0 < \delta_0 < 1$.

в) $f(t)$ зависит только от $\sigma(\tau)$ при $\tau \leq t$, t_n зависит только от $\sigma(\tau)$ при $\tau \leq t_n$;

г) для каждого n существует такое $\tilde{t}_n \in [t_n, t_{n+1})$, что величина

$$v_n = \frac{1}{t_{n+1} - t_n} \int_{t_n}^{t_{n+1}} f(t) dt$$

удовлетворяет соотношению

$$v_n = \varphi(\sigma(\tilde{t}_n)), \quad (4)$$

где $\varphi(\sigma)$ — непрерывная функция, $\varphi(0) = 0$,

$$\varphi(\sigma)\sigma > 0 \text{ при } \sigma \neq 0, \quad |\varphi(\sigma)| \leq \varphi_+ = \text{const при } -\infty < \sigma < +\infty. \quad (5)$$

Уравнения (1), (2) описывают широкий класс нелинейных импульсных систем [1, 2, 3] с различными видами импульсной модуляции (амплитудной, широтной, частотной и др.). При этом $\sigma(t)$ является сигналом на входе модулятора, $f(t)$ — сигнал на его выходе, $\varphi(\sigma)$ — статическая характеристика модулятора. Свойствами а) - г) обладает большинство из известных законов модуляции.

В настоящей работе с помощью развитого в [3] метода усреднения и анализа функций Ляпунова в виде формы четвертого порядка [4] получен новый частотный критерий устойчивости системы (1), (2), учитывающий свойства производной $\frac{d\varphi}{d\sigma}$.

2 Формулировка результата

Рассмотрим передаточную (от $-f$ к σ) функцию $G(p) = c'(A - pI_m)^{-1}b$ (I_m — единичная $m \times m$ матрица) и предположим выполнение следующих условий:

$$\rho = \lim_{p \rightarrow 0} pG(p) > 0, \quad (6)$$

$$\lim_{p \rightarrow \infty} pG(p) = \lim_{p \rightarrow \infty} p^2G(p) = 0. \quad (7)$$

Введем обозначения: $W(p) = G(p) - \frac{\rho}{p}$, $w(t)$ — оригинал (по Лапласу) функции $W(p)$,

$$\mu = \int_0^{\infty} (|w(t)| + T|\dot{w}(t)|) dt, \quad \sigma'_+ = (2\mu + \rho T)\varphi_+. \quad (8)$$

Пусть σ_+ — положительное число, такое что $\sigma_+ < \sigma'_+$. Потребуем, чтобы функция $\varphi(\sigma)$ удовлетворяла условиям

$$\frac{1}{\sigma_*} > \frac{\varphi(\sigma)}{\sigma} > \delta \quad \text{при } 0 < |\sigma| \leq \sigma_+, \quad (9)$$

$$0 \leq \frac{d\varphi}{d\sigma} \leq l \quad \text{при } 0 < |\sigma| \leq \sigma_+, \quad (10)$$

где σ_* и δ — положительные постоянные.

Введя функции $v(t) = v_n$ при $t_n \leq t < t_{n+1}$ и $u(t) = \int_0^t [f(s) - v(s)] ds$ и сделав в системе (1) замену $z = x + bu$, преобразуем ее к виду

$$\dot{x} = A_\delta x + b\psi + Abu, \quad \sigma = c'x, \quad (11)$$

где $\psi(t) = v(t) - \delta\sigma(t)$, $A_\delta = A + \delta bc'$. (При этом мы воспользовались свойством $c'b = 0$, вытекающим из (7)).

Рассмотрим вектор

$$y = \text{col}(x_1^2, x_1x_2, \dots, x_1x_n, x_2^2, x_2x_3, \dots, x_2x_n, \dots, x_n^2),$$

где x_1, \dots, x_n — составляющие вектора x . Продифференцировав y по t в силу системы (11), приходим к уравнению

$$\dot{y} = Py + q_1\eta_1 + q_2\eta_2, \quad (12)$$

где $y \in \mathbf{R}^l$, $l = \frac{m(m+1)}{2}$, $\eta_1 = \psi x$, $\eta_2 = xu$, P — постоянная $l \times l$ -матрица, q_1 и q_2 — постоянные $l \times m$ -матрицы.

Пусть $x\varphi(\sigma) = g$; Q, D — вещественные, вообще говоря, несимметричные $m \times m$ -матрицы, удовлетворяющие при $x \neq 0$ условию

$$x'Qx > 0, \quad x'Dx < 0. \quad (13)$$

Определим матрицы $M_1 = M'_1, M_2, M_3, C, h, C_1, R, S$ из тождеств

$$(x'Qx)^2 \equiv y'M_1y, \quad (c'x)^2(c'Ax)^2 \equiv y'M_2y,$$

$$|x|^2(c'x)^2 \equiv y'M_3y, \quad xc'x \equiv Cy,$$

$$hxc'A_\delta x \equiv Dy,$$

$$Qxc'x \equiv C_1y,$$

$$y'hb\psi\varphi \equiv \eta_1Rg,$$

$$y'hAbu\varphi \equiv \eta_2Sg.$$

Рассмотрим квадратичные формы

$$G(y, \eta_1, \eta_2) = \eta'_1 Q(\sigma_1 \eta_1 - Cy) - y'My - \frac{8T^2}{\varepsilon\pi^2}(1 + 2\delta\sigma_1^2)(c' A \eta_1)^2 + \\ + \tau|\eta_2|^2 - 2\tau T^2|\eta_1|^2, \quad (14)$$

$$G_1(y, \eta_1, \eta_2, g) = G - (Py + q_1\eta_1 + q_2\eta_2)hg - y'hA_\delta g - \eta_1Rg - \eta_2Sg - \\ - \tau_1 g'(C_1y - \sigma_*Qg), \quad (15)$$

где $M = \frac{\varepsilon}{2}M_1 + \frac{8T^2\delta^2}{\varepsilon\pi^2}M_2 + 2\delta^2T^2\tau M_3$, $\sigma_1 = \frac{\sigma_*}{1-\delta\sigma_*}$, ε и τ — скалярные параметры. Распространим форму $G_1(y, \eta_1, \eta_2, g)$ до эрмитовой и рассмотрим в \mathbf{C}^{3m} эрмитову форму

$$\Phi(\xi_1, \xi_2, \xi_3) = G_1[(i\omega I_l - P)^{-1}(q_1\xi_1 + q_2\xi_2), \xi_1, \xi_2, \xi_3].$$

Теорема. Пусть выполнены условия (3)–(9), матрица A_δ — гурвицева и существуют такие удовлетворяющие (13) матрицы Q, D и такие $\varepsilon > 0$, $\tau > 0$, $\tau_1 > 0$, $\varepsilon_0 > 0$, что при всех $\omega \geq 0$ и $\xi_1, \xi_2, \xi_3 \in \mathbf{C}^m$ справедливо неравенство

$$\Phi(\xi_1, \xi_2, \xi_3) \geq \varepsilon_0(|\xi_1|^2 + |\xi_2|^2) + |\xi_3|^2. \quad (16)$$

Тогда для всех решений системы (1)-(2) выполнено

$$z(t) \rightarrow 0 \text{ при } t \rightarrow +\infty.$$

3 Доказательство теоремы

Убедимся сначала в справедливости соотношения

$$\overline{\lim}_{t \rightarrow +\infty} |\sigma(t)| \leq \varphi_+(2\mu + \rho T). \quad (17)$$

Тогда из (8) получим, что для достаточно больших t нелинейность $\varphi(t)$ удовлетворяет секториальному условию (9).

Система (1) известным способом сводится к интегро-функциональному уравнению

$$\sigma(t) = \alpha(t) + \sigma_0 - \int_0^t [w(t - \lambda) + \rho] f(\lambda) d\lambda,$$

где $\alpha(t) \rightarrow 0$ при $t \rightarrow +\infty$, σ_0 — постоянная. Добавим к $f(\lambda)$ и вычтем v и, проинтегрировав по частям и воспользовавшись условиями (7), представим это уравнение в виде системы

$$\sigma(t) = k(t) - \rho\xi(t), \quad (18)$$

$$\dot{\xi} = v, \quad \xi(0) = -\sigma_0/\rho, \quad (19)$$

где $k(t) = \alpha(t) - \int_0^t [w(t - \lambda)v(\lambda) + \dot{w}(t - \lambda)u(\lambda)] d\lambda$. Ввиду (4), (5) справедлива оценка

$$|v(t)| \leq \varphi_+. \quad (20)$$

Известно [4, 5] соотношение

$$|u(t)| \leq T|v(t)|. \quad (21)$$

Отсюда очевидно неравенство

$$\overline{\lim}_{t \rightarrow +\infty} |k(t)| \leq \int_0^\infty w(t) + T\dot{w}(t) dt \varphi_+ = \mu\varphi_+$$

и, следовательно, для любого $\varepsilon > 0$ найдется такое N_1 , что при $t > t_{N_1}$ имеет место соотношение

$$|k(t)| \leq \mu\varphi_+ + \varepsilon. \quad (22)$$

Рассмотрим $n > N_1$ и пусть $\rho\xi(\tilde{t}_n) \geq \mu\varphi_+ + 2\varepsilon$. Тогда из (18), (22) следует неравенство $\sigma(\tilde{t}_n) \leq -\varepsilon$. Отсюда в силу (4), (9) вытекает оценка

$v_n \leq -\delta\varepsilon$. Поэтому согласно (19) справедливо $\dot{\xi}(t) \leq -\delta\varepsilon$ при $t \in [t_n, t_{n+1})$. Аналогично доказывается, что если $\rho\xi(\tilde{t}_n) \leq -(\mu\varphi_+ + 2\varepsilon)$, то $\dot{\xi}(t) \geq \delta\varepsilon$ при $t \in [t_n, t_{n+1})$. Поэтому найдется такое $N_2 > N_1$, что $|\rho\xi(\tilde{t}_n)| \leq \mu\varphi_+ + 2\varepsilon$ при $n > N_2$. Поскольку $|\rho\xi(t) - \rho\xi(\tilde{t}_n)| \leq \rho T\varphi_+$ ввиду (5), (19), то $|\rho\xi(t)| \leq (\mu + \rho T)\varphi_+ + 2\varepsilon$ при $t \in [t_n, t_{n+1})$ и $n > N_2$. И, следовательно, согласно (18), (22) справедлива оценка

$$|\sigma(t)| \leq (2\mu + \rho T)\varphi_+ + 3\varepsilon.$$

Отсюда в силу произвольности ε вытекает свойство (17). Из (17), (9) следует существование такого N_* , что при $n > N_*$ справедливо неравенство

$$(\sigma_1\bar{\psi} - \bar{\sigma})\bar{\psi} \leq 0, \tag{23}$$

где $\bar{\sigma}(t) = \sigma(\tilde{t}_n)$, $\bar{\psi}(t) = \psi(\tilde{t}_n)$ при $t \in [t_n, t_{n+1})$.

Убедимся теперь, что на решениях системы (12) при $n > N_*$ справедлива оценка

$$\int_{t_n}^{t_{n+1}} G(y, \eta_1, \eta_2) dt \leq 0. \tag{24}$$

Действительно,

$$\begin{aligned} \eta_1' Q(\sigma_1\eta_1 - Cy) &= x' Qx(\sigma_1\psi^2 - \psi\sigma) = \\ &= x' Qx(\sigma_1\bar{\psi}^2 - \bar{\psi}\bar{\sigma}) + x' Qx[(\bar{\psi}\bar{\sigma} - \psi\sigma) + \sigma_1(\psi^2 - \bar{\psi}^2)]. \end{aligned}$$

В силу (23) очевидным образом получаем оценку

$$\eta_1' Q(\sigma_1\eta_1 - Cy) \leq \frac{\varepsilon}{2}(x' Qx)^2 + \frac{1}{\varepsilon}(S_1 + \sigma_1^2 S_2), \tag{25}$$

где $S_1 = (\bar{\psi}\bar{\sigma} - \psi\sigma)^2$, $S_2 = (\bar{\psi}^2 - \psi^2)^2$.

Согласно неравенству Виртингера [4, 5] и свойству (3) имеем неравенства

$$\int_{t_n}^{t_{n+1}} S_1 dt \leq \frac{4T^2}{\pi^2} \int_{t_n}^{t_{n+1}} \left[\frac{d(\psi\sigma)}{dt}\right]^2 dt, \quad \int_{t_n}^{t_{n+1}} S_2 dt \leq \frac{4T^2}{\pi^2} \int_{t_n}^{t_{n+1}} \left[\frac{d(\psi^2)}{dt}\right]^2 dt.$$

Поскольку

$$\frac{d(\psi\sigma)}{dt} = \psi\dot{\sigma} - \delta\dot{\sigma}\sigma, \quad \frac{d(\psi^2)}{dt} = -2\delta\psi\dot{\sigma},$$

то

$$\left[\frac{d(\psi\sigma)}{dt}\right]^2 \leq 2\psi^2\dot{\sigma}^2 + 2\delta^2\sigma^2\dot{\sigma}^2, \quad \left[\frac{d(\psi^2)}{dt}\right]^2 = 4\delta^2\psi^2\dot{\sigma}^2.$$

Условия (7) равносильны равенствам $c'b = c'Ab = 0$. Поэтому $\dot{\sigma} = c'Ax$ и

$$\begin{aligned} \frac{1}{\varepsilon} \int_{t_n}^{t_{n+1}} (S_1 + \sigma_1^2 S_2) dt &\leq \frac{4T^2}{\pi^2} \int_{t_n}^{t_{n+1}} [2\delta^2(c'x)^2(c'Ax)^2 + \\ &+ (2 + 4\delta\sigma_1^2)\psi^2(c'Ax)^2] dt. \end{aligned} \quad (26)$$

В силу (21) справедливы соотношения

$$|\eta_2|^2 \leq T^2|x|^2v^2 \leq 2T^2|x|^2(\psi^2 + \delta^2\sigma^2).$$

Отсюда получаем оценку

$$|\eta_2|^2 \leq 2T^2|\eta_1|^2 + 2\delta^2T^2|x|^2(c'x)^2. \quad (27)$$

Неравенство (24) вытекает из соотношений (25)–(27).

Рассмотрим функцию Ляпунова

$$V(y) = y'H y + y'hg, \quad (28)$$

где H — положительно-определенная $l \times l$ -матрица, которая будет выбрана ниже. Продифференцировав $V(y(t))$ по t в силу системы (12), приходим к представлению

$$\begin{aligned} \dot{V} &= W(y, \eta_1, \eta_2, g) + \\ &+ G(y, \eta_1, \eta_2) - \tau_1 g'(C_1 y - \sigma_* Q g) + y' D y \frac{d\varphi}{d\sigma}, \end{aligned} \quad (29)$$

где

$$W(y, \eta_1, \eta_2, g) = 2y'H(Py + q_1\eta_1 + q_2\eta_2) - G_1(y, \eta_1, \eta_2, g).$$

Из гурвицевости матрицы A_δ вытекает [4] гурвицевость матрицы P . По частотной теореме В.А.Якубовича для невырожденного случая [5] в силу условия (16) теоремы существует такая положительно-определенная $l \times l$ -матрица H и такое $\mu_0 > 0$, что выполнено неравенство

$$W(y, \eta_1, \eta_2, g) \leq -\mu_0(|y|^2 + |\eta_1|^2 + |\eta_2|^2 + |g|^2). \quad (30)$$

В силу (5), (9) и из определения C_1, Q имеем

$$g'(C_1 y - \sigma_* Q g) = x' Q x (c'x - \sigma_* \varphi) \varphi \geq 0, \quad (31)$$

и из определения D и (10) получим

$$y' Dy \frac{d\varphi}{d\sigma} \leq 0. \quad (32)$$

Из (29), (30), (31), (32) вытекает оценка

$$\dot{V} \leq G(y, \eta_1, \eta_2) - \mu_0(|y|^2 + |\eta_1|^2 + |\eta_2|^2 + |g|^2). \quad (33)$$

Введя обозначение $V_n = V(y(t_n))$, из (33) в силу (24) получим следующее соотношение

$$\mu_0 \int_{t_n}^{t_{n+1}} (|\eta_1|^2 + |\eta_2|^2) dt + V_{n+1} - V_n \leq -\mu_0 \int_{t_n}^{t_{n+1}} (|y(t)|^2 + |g(t)|^2) dt.$$

Отсюда

$$V_{n+1} \leq V_n \leq V_{N_*} \quad n > N_* \quad (34)$$

и

$$\mu_0 \int_{t_n}^{t_{n+1}} (|\eta_1|^2 + |\eta_2|^2) dt \leq V_n - V_{n+1}. \quad (35)$$

Так как $y'Hy$ растет как x^4 и выполнено (5), то $V \rightarrow \infty$ при $x \rightarrow \infty$, а это противоречит (34), следовательно x ограничен и ограничена V_n .

Просуммировав эти неравенства по n от N_* до произвольного целого N , получим соотношение

$$\mu_0 \int_{t_{N_*}}^{t_{N+1}} (|\eta_1|^2 + |\eta_2|^2) dt \leq V_{N_*} - V_{N+1} \leq V_{N_*} - \inf(V).$$

Поскольку в силу (3) $t_n \rightarrow +\infty$ при $n \rightarrow \infty$, то из полученного неравенства вытекает свойство

$$|\eta_1|, |\eta_2| \in L_2[0, +\infty).$$

Отсюда ввиду гурвицевости матрицы P в системе (12) следует, что $y(t) \rightarrow 0$ при $t \rightarrow +\infty$. А тогда этим же свойством обладает $x(t)$. Из (9) вытекает асимптотика $v(t) \rightarrow 0$ при $t \rightarrow +\infty$, откуда в силу (21) следует, что $u(t) \rightarrow 0$ при $t \rightarrow +\infty$. Поэтому $z(t) \rightarrow 0$ при $t \rightarrow +\infty$.

Теорема доказана.

Литература

- [1] Цыпкин Я.З., Попков Ю.С. Теория нелинейных импульсных систем. М.: Наука, 1973, 414 с. Фамилия И.О. Название монографии. М.: Мир, 1975, 683с.
- [2] Кунцевич В.М., Чеховой Ю.Н. Нелинейные системы управления с частотно- и широтно-импульсной модуляцией. Киев: Наукова думка, 1970, 340 с.
- [3] Gelig A.Kh., Churilov A.N. Stability and Oscillations of Nonlinear Pulse-Modulated Systems. Birkhäuser, Boston, 1998, 362 p.
- [4] Баркин А.И., Зеленцовский А.Л., Пакшин П.В. Абсолютная устойчивость детерминированных и стохастических систем управления. М.: Изд-во МАИ, 1992, 303 с.
- [5] Гелиг А.Х., Леонов Г.А., Якубович В.А. Устойчивость нелинейных систем с неединственным состоянием равновесия. М.: Наука, 1978, 400с.