



ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ УРАВНЕНИЯ  
И  
ПРОЦЕССЫ УПРАВЛЕНИЯ  
№ 4, 2014  
Электронный журнал,  
рег. Эл. № ФС77-39410 от 15.04.2010  
ISSN 1817-2172

<http://www.math.spbu.ru/diffjournal>  
e-mail: [jodiff@mail.ru](mailto:jodiff@mail.ru)

*Монография*

## ПЕРИОДИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ С БЕСКОНЕЧНЫМ МНОЖЕСТВОМ УСТОЙЧИВЫХ ПЕРИОДИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ

Васильева Е.В.

Санкт-Петербургский Государственный университет

В работе изучается проблема существования бесконечного числа устойчивых периодических решений в окрестности нетрансверсального гомоклинического решения периодической системы дифференциальных уравнений. Из работ Ш. Ньюхауса, Л. П. Шильникова, Б. Ф. Иванова и других авторов следует, что при определенном способе касания устойчивого и неустойчивого многообразий окрестность нетрансверсального гомоклинического решения может содержать счетное множество устойчивых периодических решений, однако, хотя бы один из характеристических показателей у таких решений стремится к нулю с ростом периода. Показано, что при ином способе касания этих многообразий окрестность нетрансверсального гомоклинического решения может содержать счетное множество устойчивых периодических решений, с отделенными от нуля характеристическими показателями.

Выделен класс двумерных периодических систем с  $r$  раз непрерывно дифференцируемой по зависимой переменной правой частью ( $1 \leq r \leq \infty$ ), имеющих счетное множество устойчивых периодических траекторий, лежащих в окрестности нетрансверсальной гомоклинической траектории, причем характеристические показатели таких периодических решений отделены от нуля. Показано, что существуют многомерные системы, обладающие тем же свойством.

Васильева Екатерина Викторовна

ПЕРИОДИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ  
ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ  
С БЕСКОНЕЧНЫМ МНОЖЕСТВОМ  
УСТОЙЧИВЫХ ПЕРИОДИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ

2014

ОГЛАВЛЕНИЕ

|   |     |
|---|-----|
| ВВЕДЕНИЕ .....  | 4   |
| ГЛАВА 1 ДИФФЕОМОРФИЗМЫ ПЛОСКОСТИ .....  | 18  |
| 1.1 ДИФФЕОМОРФИЗМЫ ПЛОСКОСТИ, ЛИНЕЙНЫЕ<br>В ОКРЕСТНОСТИ НУЛЯ .....                | 18  |
| 1.2 ДИФФЕОМОРФИЗМЫ ПЛОСКОСТИ. ОБЩИЙ СЛУЧАЙ .....                                  | 30  |
| 1.3 СПОСОБЫ ПОСТРОЕНИЯ ФУНКЦИЙ,<br>УДОВЛЕТВОРЯЮЩИХ УСЛОВИЯМ ТЕОРЕМ 1.1, 1.2 ..... | 50  |
| ГЛАВА 2 ГЛАДКИЕ ДИФФЕОМОРФИЗМЫ ПЛОСКОСТИ .....                                    | 65  |
| 2.1 ДИФФЕОМОРФИЗМЫ ПЛОСКОСТИ КОНЕЧНОГО<br>КЛАССА ГЛАДКОСТИ .....                  | 65  |
| 2.2 БЕСКОНЕЧНО ГЛАДКИЕ ДИФФЕОМОРФИЗМЫ<br>ПЛОСКОСТИ .....                          | 86  |
| ГЛАВА 3 МНОГОМЕРНЫЕ ДИФФЕОМОРФИЗМЫ .....  | 103 |
| ЗАКЛЮЧЕНИЕ .....  | 131 |
| СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ .....   | 133 |

## ВВЕДЕНИЕ

Диссертация посвящена проблеме существования бесконечного числа устойчивых периодических решений в окрестности гомоклинического решения периодической системы дифференциальных уравнений.

Рассматривается система уравнений вида

$$\frac{dz}{dt} = Z(t, z), \quad (0.1)$$

где  $z, Z$  –  $N$ -векторы, вектор  $Z$  непрерывен по  $(t, z)$  и  $r$  раз непрерывно дифференцируем по  $z$ ,  $1 \leq r \leq \infty$ , кроме того, вектор-функция  $Z$   $\omega$ -периодична по  $t$ :  $Z(t + \omega, z) = Z(t, z)$ ,  $\omega > 0$ . Предполагается, что система (0.1) имеет гиперболическое  $\omega$ -периодическое решение  $z = \bar{\varphi}(t)$ .

Обозначим через  $W^s(t), W^u(t)$  устойчивое и неустойчивое многообразия решения  $\bar{\varphi}(t)$ ,  $\dim W^s = k, \dim W^u = N - k, 1 \leq k < N$ .

Предполагается, что пересечение  $W^s(0) \cap W^u(0)$  не сводится к точке  $\bar{\varphi}(0)$  и любая точка  $w \in W^s(0) \cap W^u(0)$ , кроме точки  $\bar{\varphi}(0)$ , изолирована в  $W^s(0) \cap W^u(0)$ . Решение  $\bar{\psi}(t)$  системы (0.1) с начальными данными  $t = 0, z = w$ , где  $w \in W^s(0) \cap W^u(0)$  есть гомоклиническое к  $\bar{\varphi}(t)$  решение.

Хорошо известно, что если пересечение  $W^s(0)$  с  $W^u(0)$  трансверсально, то в окрестности гомоклинического решения  $\bar{\psi}(t)$  существует бесконечно много периодических решений и все эти решения неустойчивы. Таким образом, появление устойчивых периодических решений в окрестности гомоклинического решения возможно, только если

пересечение  $W^s(0)$  с  $W^u(0)$  нетрансверсально. В этом случае решение  $\bar{\psi}(t)$  часто называют нетрансверсальным гомоклиническим решением.

Исследованию решений, расположенных в окрестности нетрансверсального гомоклинического решения, посвящена обширная литература [1]-[3], [21]-[36]. Список литературы далеко не полон, в нем упомянуты лишь те работы, которые имеют непосредственное или хотя бы косвенное отношение к диссертации. При этом лишь в немногочисленных работах рассматривается проблема устойчивости периодических решений, расположенных в окрестности гомоклинического решения. При исследовании окрестности гомоклинического решения различают однообходные и многообходные периодические решения. Решение называют  $s$ -обходным, если его траектория имеет  $s$  витков в окрестности цикла, образованного гомоклинической траекторией. В работах [21, 22, 28] рассматривалась система дифференциальных уравнений (0.1). При специальных (впрочем, весьма естественных) условиях, наложенных на характер касания  $W^s(0)$  и  $W^u(0)$ , было установлено, что все однообходные периодические решения неустойчивы. В работе [28] показано, что среди многообходных решений может появиться бесконечно много устойчивых решений. Однако, детальный анализ доказательств, представленных в работах [1] и [28] показывает, что с ростом периодов один из характеристических показателей таких решений стремится к нулю.

В 1977 году В.А. Плисс [31] привел пример двумерной системы (0.1), имеющей в окрестности гомоклинического контура бесконечно много устойчивых периодических решений с отделенными от нуля характеристическими показателями.

В связи с этим примером возникают следующие проблемы:

1. Нельзя ли указать класс двумерных систем, обладающих тем же свойством?
2. Нельзя ли сделать то же самое в случае, когда вектор  $Z$   $r$  раз непрерывно дифференцируем по  $z$  с  $r > 1$ ?
3. Существуют ли двумерные системы с бесконечно гладкой правой частью, имеющие бесконечное число однообходных устойчивых периодических решений с отделенными от нуля характеристическими показателями?
4. Указать класс многомерных систем с тем же свойством.

Эти проблемы исследуются в диссертации.

Перейдем к описанию содержания диссертации. Обозначим через  $z(t, v)$  решение с начальными данными  $t = 0, z = v$ . Преобразование Пуанкаре  $f(v) = z(\omega, v)$  есть диффеоморфизм  $N$ -мерного пространства в себя гладкости  $r$ . Каждому диффеоморфизму евклидова пространства соответствует периодическая система дифференциальных уравнений, для которой он служит преобразованием Пуанкаре [5, 30], поэтому дальнейшее изложение удобнее вести на языке диффеоморфизмов. Отметим, что в большинстве упомянутых выше работ рассматриваются именно диффеоморфизмы.

Диссертация состоит из введения и трех глав.

В первой главе доказывается, что при некоторых условиях диффеоморфизм плоскости в себя имеет в окрестности нетрансверсальной гомоклинической точки счетное множество устойчивых периодических точек с отделенными от нуля характеристическими показателями.

Во второй главе показывается, что результат первой главы может иметь место для диффеоморфизма плоскости произвольного класса гладкости, включая случай  $C^\infty$ .

В третьей главе доказывается, что аналогичный результат имеет место и в случае диффеоморфизма многомерного пространства в себя.

Пусть  $f$  – диффеоморфизм плоскости в себя с неподвижной гиперболической точкой в начале координат, предположим, что в некоторой окрестности нуля  $V$  диффеоморфизм  $f$  имеет вид

$$f \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \lambda x + p(x, y) \\ \mu y + q(x, y) \end{pmatrix}, \quad (0.2)$$

где  $\lambda$  и  $\mu$  положительные действительные числа такие, что  $0 < \lambda < 1 < \mu$ , а  $p, q$  непрерывно дифференцируемые в окрестности нуля функции такие, что

$$p(0,0) = q(0,0) = 0, \\ \frac{\partial p(0,0)}{\partial x} = \frac{\partial p(0,0)}{\partial y} = \frac{\partial q(0,0)}{\partial x} = \frac{\partial q(0,0)}{\partial y} = 0.$$

Пусть

$$\lambda\mu < 1. \quad (0.3)$$

Предположим, что

$$p(0, y) = q(x, 0) = 0, \\ (0, y) \in V, (x, 0) \in V. \quad (0.4)$$

Пусть  $W^s, W^u$  – устойчивое и неустойчивое многообразия гиперболической точки. Пусть  $w$  – гомоклиническая точка, а именно,  $w \neq 0, w \in W^s \cap W^u$ , ясно, что имеют место следующие соотношения

$$\lim_{j \rightarrow \infty} \|f^j(w)\| = \lim_{j \rightarrow \infty} \|f^{-j}(w)\| = 0,$$

где  $f^j, f^{-j}$  – степени порядка  $j$  диффеоморфизмов  $f$  и  $f^{-1}$ .

Из последних соотношений следует, что орбита гомоклинической точки является ограниченным множеством, кроме того, существуют целые числа  $j_1, j_2$  ( $j_1 < j_2$ ) такие, что выполняются включения

$$f^j(w) \in V, j \leq j_1, j \geq j_2.$$

Предположим, что  $j_2 - j_1 > 1$  и  $f^{j_1+i}(w) \notin V, i = 1, 2, \dots, j_2 - j_1 - 1$ .

Пусть  $u_1 = f^{j_1}(w), u_2 = f^{j_2}(w)$ , ясно, что  $f^{j_2-j_1}(u_1) = u_2$ , фиксируем  $U$  достаточно малую окрестность точки  $u_1$  такую, что  $U \subset V, f^{j_2-j_1}(U) \subset V, f(U) \cap V = \emptyset$ .

Под расширенной окрестностью орбиты точки  $w$  будем понимать объединение  $\widehat{V} = V \cup f(U) \cup f^2(U) \cup \dots \cup f^{j_2-j_1-1}(U)$ .

Обозначим через  $L$  следующее сужение,  $L = f^{j_2-j_1}|_U$ . Периодическая точка диффеоморфизма  $f$ , траектория которой лежит в  $\widehat{V}$ , называется  $s$ -обходной периодической точкой, если эта периодическая точка является неподвижной точкой отображения  $f^{l_1} L f^{l_2} L \dots f^{l_s} L$ , где  $l_1, l_2, \dots, l_s$  натуральные числа.

Обозначим координаты точек  $u_1, u_2$  в окрестности  $V$  следующим образом  $u_1 = (0, y^0), u_2 = (x^0, 0)$ , предположим, что

$$x^0 > 0, y^0 > 0. \quad (0.5)$$

Запишем отображение  $L$  в координатах

$$L \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x^0 + ax + b(y - y^0) + \varphi(x, y - y^0) \\ cx + g(y - y^0) + \psi(x) \end{pmatrix}, \quad (0.6)$$

где  $a, b, c$  действительные числа такие, что  $b < 0, c > 0$ , а  $g, \varphi, \psi$  непрерывно дифференцируемые функции такие, что

$$\begin{aligned} \varphi(0,0) = \psi(0) = g(0) = 0, \\ \frac{\partial \varphi(0,0)}{\partial x} = \frac{\partial \varphi(0,0)}{\partial y} = 0, \psi'(0) = g'(0) = 0. \end{aligned}$$

Условие  $g'(0) = 0$  означает, что точка  $u_2$  является точкой касания устойчивого и неустойчивого многообразий.



Предположим, что производные первого порядка функций  $\varphi$ ,  $\psi$  ограничены положительной постоянной  $M$  в окрестности нуля.

Характер касания устойчивого и неустойчивого многообразий определяется свойствами функции  $g$ . Для того чтобы сформулировать основные результаты первой главы работы, определим эти свойства.

Пусть  $(\sigma_k - \varepsilon_k, \sigma_k + \varepsilon_k)$  – последовательность интервалов, причем

$$\begin{aligned} \sigma_k > \sigma_{k+1} > 0, \varepsilon_k > 0, \\ \lim_{k \rightarrow \infty} \sigma_k = \lim_{k \rightarrow \infty} \varepsilon_k = 0, \end{aligned} \quad (0.7)$$

кроме того,

$$\sigma_k - \varepsilon_k > \sigma_{k+1} + \varepsilon_{k+1}, \quad (0.8)$$

предполагается, что условия (0.7), (0.8) имеют место для любого  $k$ . Из (0.8) следует, что интервалы  $(\sigma_k - \varepsilon_k, \sigma_k + \varepsilon_k)$  не пересекаются.

Обозначим через  $d$  следующую постоянную

$$d = \min \left[ 0.25, 0.25(|b| + M)^{-1} \right].$$

Пусть  $m_k$  – строго возрастающая последовательность натуральных чисел такая, что

$$(\lambda\mu)^{m_k} < \varepsilon_k. \quad (0.9)$$

Предположим, что непрерывно дифференцируемая функция  $g$  удовлетворяет следующим условиям

$$\left| g(\sigma_k) + \lambda^{m_k} c(x^0 + b\sigma_k)(1 - \lambda^{m_k} a)^{-1} - (y^0 + \sigma_k)\mu^{-m_k} \right| < 0.25d\varepsilon_k\mu^{-m_k} \quad (0.10)$$

для любого  $k$ .

Существует постоянная величина  $\alpha > 1$  такая, что справедливы неравенства

$$\left| g'(t) \right| < \mu^{-\alpha m_k}, t \in (\sigma_k - \varepsilon_k, \sigma_k + \varepsilon_k) \quad (0.11)$$

для любого  $k$ .

Условия (0.10), (0.11) определяют характер касания устойчивого и неустойчивого многообразий в точке  $u_2$ .

Первая глава работы разделена на три раздела, в первом разделе первой главы доказывается следующая теорема.

**Теорема 1.1.** Пусть  $f$  – диффеоморфизм плоскости в себя с неподвижной гиперболической точкой в начале координат, предположим, что  $f$  линеен в окрестности нуля  $V$ . Предположим, что существует нетрансверсальная гомоклиническая точка  $u_2$ . Пусть выполнены условия (0.2) - (0.11), тогда расширенная окрестность гомоклинической точки  $\hat{V}$  содержит счетное множество устойчивых неподвижных точек отображения  $f^{m_k}L$ , причем характеристические показатели у таких точек отрицательны и отделены от нуля.

Таким образом, если касание устойчивого и неустойчивого многообразий определяется неравенствами (0.10), (0.11), то диффеоморфизм  $f$  имеет счетное множество однообходных устойчивых периодических точек с отделенными от нуля характеристическими показателями.

Во втором разделе первой главы доказывается теорема 1.2, аналогичная теореме 1.1, но снимается предположение о том, что диффеоморфизм  $f$  является линейным в  $V$ , а именно, функции  $p, q$ , определенные в (0.2), могут быть не равны тождественно нулю в  $V$ . Характер касания устойчивого и неустойчивого многообразий в этом случае задается условиями, аналогичными условиям (0.10), (0.11).

В третьем разделе первой главы показан способ построения функции, удовлетворяющей условиям (0.10), (0.11). Кроме того, строятся примеры функций  $p, q$ , удовлетворяющих условиям основной теоремы второго раздела первой главы.

Основные результаты первой главы опубликованы в работах [6-9, 16].

Во второй главе работы рассматриваются диффеоморфизмы плоскости в себя класса  $C^r$  ( $1 \leq r \leq \infty$ ), эта глава имеет два раздела.

В первом разделе второй главы изучаются диффеоморфизмы конечного класса гладкости, имеющие нетрансверсальную гомоклиническую точку. Здесь представлены теоремы аналогичные теоремам 1.1, 1.2 главы 1, также в этом разделе показан способ построения множества функций, определенных в окрестности нуля, удовлетворяющих условиям (0.10), (0.11), кроме того имеющих в этой окрестности нуля непрерывные производные до порядка  $r$  включительно ( $1 \leq r < \infty$ ).

Здесь же доказывается следующая теорема.

**Теорема 2.2.** Пусть  $g$  –  $C^r$  гладкая функция одной переменной, определенная в окрестности нуля, пусть выполнены условия (0.10), (0.11), тогда  $g^{(i)}(0) = 0, i = 0, 1, \dots, r$ .

Во втором разделе второй главы показано, что утверждения теорем 1.1, 1.2 первой главы справедливы и в случае диффеоморфизма плоскости в себя класса  $C^\infty$ , также показан способ построения множества бесконечно дифференцируемых функций, удовлетворяющих условиям (0.10), (0.11). Кроме того, доказано, что у бесконечно дифференцируемой функции  $g$ , которая удовлетворяет всем вышеперечисленным свойствам, все производные в нуле равны нулю.

Результаты второй главы опубликованы в работах [10, 12, 13, 17, 18].

Третья глава работы посвящена изучению окрестности нетрансверсальной гомоклинической точки диффеоморфизма  $(n + m)$ -мерного пространства в себя. Основная цель этой главы – показать, что предыдущие результаты могут иметь место и в случае многомерного диффеоморфизма, а именно, при определенных условиях диффеоморфизм имеет в окрестности гомоклинической точки счетное

множество устойчивых периодических точек с отделенными от нуля характеристическими показателями.

Пусть  $f$  – диффеоморфизм  $(n+m)$ -мерного пространства в себя с неподвижной гиперболической точкой в начале координат.

Обозначим через  $\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$  векторы  $(n+m)$ -мерного пространства, где

$$x = \text{col}(x_1, \dots, x_m), y = \text{col}(y_1, \dots, y_n).$$

Предположим, что диффеоморфизм  $f$  линеен в некоторой окрестности  $\bar{V}$  начала координат.

Считаем, что

$$Df(0) = \begin{pmatrix} \Lambda & 0 \\ 0 & M \end{pmatrix}, \quad (0.12)$$

где  $\Lambda, M$  квадратные матрицы порядка  $m$  и  $n$  соответственно.

Пусть

$$\Lambda = \text{diag}[\lambda_1, \dots, \lambda_m], M = \text{diag}[\mu_1, \dots, \mu_n],$$

где  $0 < \lambda_1 \leq \dots \leq \lambda_m < 1 < \mu_1 \leq \dots \leq \mu_n$ .

Обозначим  $\lambda = \lambda_m, \mu = \mu_1 \mu_2 \dots \mu_n$ . Предположим, что

$$\lambda \mu < 1. \quad (0.13)$$

Ясно, что в окрестности  $\bar{V}$  диффеоморфизм  $f$  задается как

$$f \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \Lambda x \\ M y \end{pmatrix}.$$

Пусть, как обычно,  $W^s, W^u$  – устойчивое и неустойчивое многообразия точки  $0$ . Предположим, что в пересечении этих многообразий лежит отличная от нуля точка, называемая гомоклинической точкой. Зафиксируем точки  $u_1, u_2$  из орбиты гомоклинической точки, лежащие в  $\bar{V}$ , и запишем координаты этих точек в виде

$$u_1 = (x_1^0, x_2^0, \dots, x_m^0, 0, \dots, 0), u_2 = (0, \dots, 0, y_1^0, y_2^0, \dots, y_n^0)$$

Пусть

$$x_i^0 > 0, i = 1, 2, \dots, m, y_i^0 > 0, i = 1, 2, \dots, n. \quad (0.14)$$

Обозначим  $x^0 = \text{col}(x_1^0, \dots, x_m^0), y^0 = \text{col}(y_1^0, \dots, y_n^0)$

Существует натуральное  $\kappa$  такое, что  $f^\kappa \begin{pmatrix} 0 \\ y^0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x^0 \\ 0 \end{pmatrix}$ . Пусть  $\bar{U}$  выпуклая окрестность точки  $u_2$  такая, что

$$\bar{U} \subset \bar{V}, f^\kappa(\bar{U}) \subset \bar{V}. \quad (0.15)$$

Обозначим через  $L$  сужение:  $L = f^\kappa|_{\bar{U}}$ .

Отображение  $L$  класса  $C^1$  определяет характер касания устойчивого и неустойчивого многообразий в точке  $u_1$ .

Пусть

$$\Omega = DL(0) = \begin{pmatrix} A & B \\ C & S \end{pmatrix};$$

ясно, что  $\Omega$  – квадратная матрица порядка  $(m+n)$  такая, что

$$\det \Omega > 0, \quad (0.16)$$

а  $A, S$  – квадратные матрицы порядка  $m$  и  $n$  соответственно. Обозначим через  $C_1, \dots, C_n, S_1, \dots, S_n$  строки матриц  $C$  и  $S$  соответственно.

Предположим, что  $S$  имеет вид

$$S = \begin{pmatrix} 0 & s_{12} & s_{13} & \dots & s_{1n} \\ 0 & 0 & s_{23} & \dots & s_{2n} \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ 0 & 0 & 0 & \dots & s_{n-1n} \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 0 \end{pmatrix}, \quad (0.17)$$

т.е. все элементы, лежащие на главной диагонали и ниже, равны нулю. Ясно, что  $\det S = 0$ , поэтому точка  $u_1$  является точкой касания устойчивого и неустойчивого многообразий.

При  $m = n = 1$  матрица  $\Omega$  имеет вид

$$\Omega = \begin{pmatrix} a & b \\ c & 0 \end{pmatrix},$$

где  $a, b, c$  действительные числа, такие что  $bc < 0$ . Этот случай рассмотрен в главах 1, 2 диссертации.

Запишем отображение  $L$  в координатах  $x, y$ ,

$$L \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x^0 \\ 0 \end{pmatrix} + \Omega \begin{pmatrix} x \\ y - y^0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} \Phi(x, y - y^0) \\ G(y - y^0) + \Psi(x, y - y^0) \end{pmatrix}, \quad (0.18)$$

где  $\Phi$  –  $m$ -мерная вектор-функция  $(n+m)$  аргументов класса  $C^1$  такая, что  $\Phi(0,0)=0$ .  $G$  и  $\Psi$  –  $n$ -мерные вектор-функции класса  $C^1$  своих аргументов, такие что  $G(0)=0$ ,  $\Psi(0,0)=0$ , причем у этих функций все производные первого порядка равны нулю в начале координат.

Пусть производные первого порядка функций  $\Phi, \Psi$  ограничены в окрестности  $\bar{U}$  постоянной  $\bar{M}$ .

Ясно, что вектор-функции  $\Phi, \Psi, G$  – многомерные аналоги функций  $\varphi, \psi, g$  из главы 1.

Опишем подробнее свойства вектор-функций  $G, \Psi$ . Пусть  $\Psi_i$  – координатная функция вектор-функции  $\Psi$  с номером  $i$  ( $i = 1, 2, \dots, n$ ), предположим, что  $\Psi_i$  не зависит от  $y_1, y_2, \dots, y_i$ , а именно,

$$\Psi_i = \Psi_i(x_1, \dots, x_m, y_{i+1} - y_{i+1}^0, \dots, y_n - y_n^0), \quad (0.19)$$

таким образом,  $\Psi_1$  – функция  $n+m-1$  аргумента, а  $\Psi_n$  зависит только от  $x$ .

Положим

$$\bar{d} = \max[1, n(\|S\| + \bar{M})].$$

Характер касания устойчивого и неустойчивого многообразий в точке  $u_1$  определяется свойствами вектор-функции  $G$ .

Запишем эту функцию в координатах

$$G(y - y^0) = \begin{pmatrix} G_1 \\ \cdot \\ \cdot \\ \cdot \\ G_n \end{pmatrix}$$

и предположим, что  $G_i$  ( $i = 1, 2, \dots, n$ ) является функцией  $i$  переменных, а именно,

$$G_i = G_i(y_1 - y_1^0, \dots, y_i - y_i^0), i = 1, 2, \dots, n, \quad (0.20)$$

ясно, что  $G_1$  является функцией одной переменной.

Свойства функции  $G$ , которые определяют способ касания многообразий, как и в случае двумерного диффеоморфизма, опишем с помощью последовательностей  $\sigma_k, \varepsilon_k$ . Предположим, что элементы этих последовательностей удовлетворяют условиям (0.7), (0.8). Пусть  $j_k$  – возрастающая последовательность натуральных чисел такая, что

$$(\lambda\mu)^{j_k} < (4\bar{d})^{-n} \varepsilon_k. \quad (0.21)$$

В дальнейшем уточним, насколько быстро последовательность  $j_k$  стремится к бесконечности.

Пусть  $\xi_k^2, \dots, \xi_k^n$  – произвольные положительные последовательности, стремящиеся к нулю, и такие, что произведения  $\xi_k^i(\lambda)^{-j_k}$  ограничены при любых  $k$  и  $i = 2, \dots, n$ .

Обозначим через  $\xi_k, \bar{x}_k$  следующие последовательности векторов

$$\xi_k = \text{col}(\sigma_k, \xi_k^2, \dots, \xi_k^n),$$

$$\bar{x}_k = [E - \Lambda^{j_k} A]^{-1} \Lambda^{j_k} (x^0 + B\xi_k),$$

нетрудно видеть, что  $\det[E - \Lambda^{jk} A] \neq 0$ , при достаточно больших номерах  $k$ , поэтому определение  $\bar{x}_k$  корректно.

Определим последовательности  $\Delta_k^i, i = 1, 2, \dots, n$  как

$$\Delta_k^1 = \varepsilon_k, \Delta_k^i = (4\bar{d})^{1-i} \varepsilon_k (\mu_1 \dots \mu_{i-1})^{-jk}.$$

Пусть функция  $G$  удовлетворяет неравенствам

$$\begin{aligned} |G_1(\sigma_k) - \mu_1^{-jk} (y_1^0 + \sigma_k) + C_1 \bar{x}_k + S_1 \xi_k| &< 0.25 \mu_1^{-jk} \varepsilon_k, \\ |G_i(\sigma_k, \xi_k^2, \dots, \xi_k^i) - \mu_i^{-jk} (y_i^0 + \xi_k^i) + C_i \bar{x}_k + S_i \xi_k| &< 0.25 \mu_i^{-jk} \Delta_k^i, \end{aligned} \quad (0.22)$$

где  $i = 2, \dots, n$ .

Предположим, что существует постоянная  $\alpha > 1$ , такая, что производные функции  $G$  удовлетворяют следующим условиям

$$\begin{aligned} \left| \frac{dG_1(t_1)}{dt_1} \right| &< \mu^{-\alpha j_k}, t_1 \in (\sigma_k - \varepsilon_k, \sigma_k + \varepsilon_k), \\ \left| \frac{\partial G_i(t_1, \dots, t_i)}{\partial t_s} \right| &< \mu^{-\alpha j_k}, \\ t_1 &\in (\sigma_k - \varepsilon_k, \sigma_k + \varepsilon_k), t_l \in (\xi_k^l - \Delta_k^l, \xi_k^l + \Delta_k^l), \end{aligned} \quad (0.23)$$

где  $i = 2, \dots, n, s = 1, 2, \dots, i, l = 2, \dots, i$ .

Из условий (0.22), (0.23) следует, что все производные первого порядка функции  $G$  в нуле равны нулю, также, эти условия определяют характер касания устойчивого и неустойчивого многообразий в точке  $u_1$ .

Ясно, что при  $m = n = 1$  условия (0.22), (0.23) представляют собой условия (0.10), (0.11).

Основной результат третьей главы состоит в следующем.

**Теорема 3.1.** Пусть  $f$  – диффеоморфизм  $(n+m)$ -мерного пространства в себя с неподвижной гиперболической точкой в начале координат, предположим, что существует нетрансверсальная гомоклиническая к ней точка. Пусть выполнены условия (0.8), (0.9), (0.13)-(0.23), тогда окрестность  $\bar{U}$  гомоклинической точки  $u_2$  содержит счетное



множество устойчивых неподвижных точек отображения  $f^{j_k} L$ , характеристические показатели которых, отрицательны и отделены от нуля.

Из сформулированной теоремы следует, что исходный диффеоморфизм имеет счетное множество однообходных устойчивых периодических точек, характеристические показатели которых отрицательны и отделены от нуля.

Основные результаты третьей главы диссертации опубликованы в [11, 14, 15, 19, 20].

## ГЛАВА 1 ДИФФЕОМОРФИЗМЫ ПЛОСКОСТИ

### 1.1 ДИФФЕОМОРФИЗМЫ ПЛОСКОСТИ, ЛИНЕЙНЫЕ В ОКРЕСТНОСТИ НУЛЯ

Пусть  $f$  – диффеоморфизм плоскости в себя с седловой неподвижной точкой в начале координат, т.е.  $f(0) = 0$ .

Считаем, что  $f$  в некоторой окрестности  $V$  начала координат имеет вид

$$\begin{aligned} f \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} \lambda x \\ \mu y \end{pmatrix}, \\ (x, y) &\in V, \end{aligned} \tag{1.1}$$

где  $0 < \lambda < 1 < \mu$ , т.е. предполагается, что  $f$  линеен в  $V$ . Этот случай является наиболее простым и наглядным. В последующих разделах этой главы диссертации предположение о линейности диффеоморфизма в малой окрестности начала координат снимается и рассматривается общий случай.

Ясно, что матрица  $Df(0)$  имеет вид

$$Df(0) = \begin{pmatrix} \lambda & 0 \\ 0 & \mu \end{pmatrix},$$

причем  $\lambda, \mu$  ее собственные числа.

Предположим, что

$$\lambda\mu < 1. \tag{1.2}$$

Пусть, как обычно,  $W^s$  – устойчивое многообразие точки 0, а  $W^u$  – неустойчивое многообразие. Ясно, что в окрестности  $V$   $W_{loc}^s$  совпадает с осью  $(0x)$ , а  $W_{loc}^u$  – с осью  $(0y)$ .

Предполагается наличие нетрасверсальной гомоклинической точки  $w$ ,

т.е.  $w \neq 0, w \in W^s \cap W^u$ , причем устойчивое и неустойчивое многообразия касаются в точке  $w$ .

Цель раздела – показать, что при определенном способе касания устойчивого и неустойчивого многообразий диффеоморфизм  $f$  имеет счетное множество устойчивых периодических точек с характеристическими показателями, отделенными от нуля.

Первоначально гомоклинические точки появились в работах А. Пуанкаре [32]. Позднее исследованием гомоклинических точек занимался Г. Д. Биркгоф [4]. Из работы С. Смейла [33] следует, что любая окрестность трансверсальной гомоклинической точки содержит инвариантное множество, на котором диффеоморфизм топологически сопряжен с гомеоморфизмом сдвига, откуда следует, что любая расширенная окрестность траектории гомоклинической точки содержит бесконечное множество периодических точек.

Задача о полном описании динамики малой окрестности трансверсальной гомоклинической точки была решена Ю.И. Неймарком [29] и Л.П. Шильниковым [36].

В диссертации рассматривается случай нетрансверсального пересечения устойчивого и неустойчивого многообразий.

Ранее окрестность нетрансверсальной гомоклинической точки двумерного диффеоморфизма изучалась в работах Б.Ф. Иванова [28], Н.К. Гаврилова и Л.П. Шильникова [21], [22], Ш. Ньюхауса [1] и других авторов. В вышеперечисленных работах предполагалось, что исходный диффеоморфизм является  $C^r$ -гладким, где  $r > 1$ , последнее условие требовалось для определения способа касания устойчивого и неустойчивого многообразий.

В этой главе диссертации рассматривается несколько иной способ касания этих многообразий, чем в вышеперечисленных работах.

Пусть  $(x^0, 0), (0, y^0)$  – точки из орбиты гомоклинической точки, лежащие в  $V$ , такие, что

$$x^0 > 0, y^0 > 0. \quad (1.3)$$

Из определения гомоклинической точки следует, что существует натуральное число  $n$  такое, что

$$f^n \begin{pmatrix} 0 \\ y^0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x^0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Определим множество  $V_1$  как

$$V_1 = \{(x, y) : |x| < \lambda^{-1}x^0, |y| < \mu y^0\}.$$

Предположим, что

$$V_1 \subset V. \quad (1.4)$$

Пусть  $U_1, U_2$  – выпуклые окрестности точек  $(0, y^0), (x^0, 0)$  такие, что

$$U_1 \subset V_1, U_2 \subset V_1, f^n(U_1) \subset V_1, U_2 \subset f^n(U_1).$$

Определим в  $U_1$  отображение  $L$  как

$$L = f^n|_{U_1}.$$

Предполагается, что  $L$  имеет следующий вид

$$L \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x^0 + ax + b(y - y^0) + \varphi(x, y - y^0) \\ cx + g(y - y^0) + \psi(x) \end{pmatrix}, \quad (1.5)$$

где  $a, b, c$  – действительные числа такие, что

$$b < 0, c > 0 \quad (1.6)$$

а  $g, \varphi, \psi$  – непрерывно дифференцируемые функции одной или двух переменных, определенные в окрестности начала координат, такие, что

$$\begin{aligned} \varphi(0, 0) = \psi(0) = g(0) = 0, \\ \frac{\partial \varphi(0, 0)}{\partial x} = \frac{\partial \varphi(0, 0)}{\partial y} = 0, \\ \psi'(0) = g'(0) = 0. \end{aligned}$$

Пусть все первые производные функций  $\varphi, \psi$  ограничены в окрестности точки 0 постоянной  $M$ , т. е.

$$\begin{aligned} \left| \frac{\partial \varphi(x, y - y^0)}{\partial x} \right| &\leq M, \\ \left| \frac{\partial \varphi(x, y - y^0)}{\partial y} \right| &\leq M, \\ (x, y) &\in U_1, \\ |\psi'(x)| &\leq M, \end{aligned}$$

последнее неравенство справедливо в окрестности нуля.

Ясно, что характер касания устойчивого и неустойчивого многообразий в точке  $(x^0, 0)$  определяется свойствами функции  $g$ , определенной ранее. Опишем свойства этой функции с помощью последовательностей. Пусть  $\sigma_k, \varepsilon_k$  – положительные, стремящиеся к нулю последовательности, такие, что при любых  $k$

$$\begin{aligned} \sigma_k > \sigma_{k+1} > 0, \varepsilon_k > 0, \\ \lim_{k \rightarrow \infty} \sigma_k = \lim_{k \rightarrow \infty} \varepsilon_k = 0. \end{aligned}$$

Предположим, что для любых  $k$  выполняются неравенства

$$\sigma_k - \varepsilon_k > \sigma_{k+1} + \varepsilon_{k+1}. \quad (1.7)$$

Из неравенств (1.7) следует, что интервалы  $(\sigma_k - \varepsilon_k, \sigma_k + \varepsilon_k)$  не пересекаются, а именно,

$$(\sigma_k - \varepsilon_k, \sigma_k + \varepsilon_k) \cap (\sigma_{k+1} - \varepsilon_{k+1}, \sigma_{k+1} + \varepsilon_{k+1}) = \emptyset,$$

таким образом, любая окрестность точки 0 содержит счетное множество непесекающихся интервалов  $(\sigma_k - \varepsilon_k, \sigma_k + \varepsilon_k)$ .

Пусть  $m_k$  – строго возрастающая последовательность натуральных чисел, т. е.

$$\begin{aligned} m_{k+1} &\geq m_k + 1, \\ \lim_{k \rightarrow \infty} m_k &= +\infty. \end{aligned}$$

Предположим, что при любых  $k$  справедливы неравенства

$$(\lambda\mu)^{m_k} < \varepsilon_k, \quad (1.8)$$

в дальнейшем уточним, насколько быстро последовательность  $m_k$  стремится к бесконечности.

Обозначим

$$d = \min \left[ 0.25, 0.25(|b| + M)^{-1} \right].$$

Кроме того, рассмотрим последовательность точек  $r_k = (x_k, y_k)$  с координатами

$$\begin{aligned} x_k &= (x^0 + b\sigma_k)(1 - a\lambda^{m_k})^{-1}, \\ y_k &= (y^0 + \sigma_k)\mu^{-m_k}. \end{aligned}$$

Ясно,

$$\lim_{k \rightarrow +\infty} x_k = x^0, \lim_{k \rightarrow +\infty} y_k = 0.$$

Считаем, что  $r_k \in U_2$ .

Отметим свойства функции  $g$ .

1.  $g$  – такая непрерывно дифференцируемая в окрестности нуля функция одной переменной, что

$$g(0) = g'(0) = 0.$$

2. Пусть

$$|g(\sigma_k) + \lambda^{m_k} c x_k - y_k| < 0.25d\varepsilon_k\mu^{-m_k}, \quad (1.9)$$

при любых  $k$ .

3. Существует  $\alpha > 1$  такое, что при  $t \in (\sigma_k - \varepsilon_k, \sigma_k + \varepsilon_k)$  и любых  $k$  справедливо неравенство

$$|g'(t)| < \mu^{-\alpha m_k}. \quad (1.10)$$

Из условий (1.9), (1.10) следует

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \frac{g(\sigma_k)}{\sigma_k} = \lim_{k \rightarrow \infty} (\mu^{m_k} \sigma_k)^{-1} = 0,$$

последние соотношения показывают, насколько быстро последовательность  $m_k$  стремится к бесконечности.

Заметим, что по фиксированным последовательностям  $\sigma_k, \varepsilon_k$ , удовлетворяющим вышеперечисленным свойствам, можно определить последовательность  $m_k$  и построить функцию  $g$ . Способ построения функции  $g$  приведен в разделе 3 этой главы.

Обозначим через  $B_k$  следующие множества

$$B_k = \{(x, y) : |x - x_k| < \sigma_k, |y - y_k| < d\varepsilon_k \mu^{-m_k}\}.$$

Считаем, что

$$B_k \subset U_2 \text{ при любых } k. \tag{1.11}$$

Для любого фиксированного номера  $k$  рассмотрим конечную последовательность множеств  $f^j(B_k), j = 0, 1, \dots, m_k$ . В силу условий (1.1), (1.4) имеем

$$\begin{aligned} f^j(B_k) &= \{(x, y) : |x - \lambda^j x_k| < \lambda^j \sigma_k, |y - \mu^j y_k| < d\varepsilon_k \mu^{-m_k + j}\}, \\ f^j(B_k) &\subset V_1, j = 0, 1, \dots, m_k. \end{aligned}$$

**Лемма 1.1.** Пусть выполнены условия (1.1)-(1.11), тогда существует  $k_0$  такое, что при  $k > k_0$ , справедливы включения

$$Lf^{m_k}(\bar{B}_k) \subset B_k, \tag{1.12}$$

где  $\bar{B}_k$  замыкание  $B_k$ .

**Доказательство.** Пусть

$$\begin{aligned} \bar{r}_k &= (\bar{x}_k, \bar{y}_k) = f^{m_k}(r_k), \\ \bar{\bar{r}}_k &= (\bar{\bar{x}}_k, \bar{\bar{y}}_k) = L(\bar{r}_k) = Lf^{m_k}(r_k). \end{aligned}$$

Ясно, что из (1.1), (1.5) следует

$$\begin{aligned}\bar{x}_k &= \lambda^{m_k} x_k, \\ \bar{y}_k &= \mu^{m_k} y_k, \\ \bar{\bar{x}}_k &= x^0 + a\lambda^{m_k} x_k + b\sigma_k + \varphi(\bar{x}_k, \sigma_k), \\ \bar{\bar{y}}_k &= c\lambda^{m_k} x_k + g(\sigma_k) + \psi(\bar{x}_k),\end{aligned}$$

или

$$\begin{aligned}\bar{\bar{x}}_k &= x_k + \varphi(\bar{x}_k, \sigma_k), \\ \bar{\bar{y}}_k &= y_k + (cx_k + g(\sigma_k) - y_k) + \psi(\bar{x}_k).\end{aligned}$$

Очевидно, что справедливы следующие соотношения

$$\begin{aligned}\lim_{k \rightarrow +\infty} \bar{x}_k &= 0, \lim_{k \rightarrow +\infty} \bar{y}_k = y^0, \\ \lim_{k \rightarrow +\infty} \bar{\bar{x}}_k &= x^0, \lim_{k \rightarrow +\infty} \bar{\bar{y}}_k = 0.\end{aligned}$$

Ясно, что при достаточно больших номерах  $k$  справедливы включения

$$\bar{r}_k \in U_1, \bar{\bar{r}}_k \in U_2, f^{m_k}(B_k) \subset U_1.$$

В дальнейшем рассматриваются номера  $k$ , для которых справедливы условия (1.11) и последние включения.

При любом фиксированном  $k$  применим к функциям  $\varphi, \psi$  теорему о среднем значении, в результате получим

$$\begin{aligned}\varphi(\bar{x}_k, \sigma_k) &= \frac{\partial \varphi(\xi_{1k} \bar{x}_k, \xi_{2k} \sigma_k)}{\partial x} \bar{x}_k + \frac{\partial \varphi(\xi_{1k} \bar{x}_k, \xi_{2k} \sigma_k)}{\partial y} \sigma_k, \\ \psi(\bar{x}_k) &= \psi'(\xi_{3k} \bar{x}_k) \bar{x}_k,\end{aligned}$$

где

$$0 \leq \xi_{ik} \leq 1, i = 1, 2, 3.$$

Обозначим

$$\begin{aligned}\Delta_{1k} &= \left| \frac{\partial \varphi(\xi_{1k} \bar{x}_k, \xi_{2k} \sigma_k)}{\partial x} \right|, \\ \Delta_{2k} &= \left| \frac{\partial \varphi(\xi_{1k} \bar{x}_k, \xi_{2k} \sigma_k)}{\partial y} \right|, \\ \Delta_{3k} &= |\psi'(\xi_{3k} \bar{x}_k)|.\end{aligned}$$



Из свойств функций  $\varphi, \psi$  следует

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \Delta_{ik} = 0, i = 1, 2, 3.$$

Из последних соотношений следуют неравенства (для достаточно больших значений  $k$ )

$$\begin{aligned} \Delta_{1k} &< 1, \\ \Delta_{2k} &< 0.25, \\ \Delta_{3k} &< 0.125d(x^0)^{-1}. \end{aligned}$$

Легко видеть, что

$$|\varphi(\bar{x}_k, \sigma_k)| \leq \Delta_{1k} |\bar{x}_k| + \Delta_{2k} \sigma_k.$$

Кроме того, из условий (1.7), (1.8) следует

$$\begin{aligned} \sigma_k &> \varepsilon_k > 0, \\ \lambda^{m_k} &< \mu^{-m_k} \varepsilon_k, \end{aligned}$$

откуда получим

$$\begin{aligned} |\bar{x}_k| &< 0.25\sigma_k, \\ |\bar{x}_k| &< 2\varepsilon_k \mu^{-m_k} x^0. \end{aligned}$$

Легко видеть, с учетом последних неравенств, что

$$\begin{aligned} |\bar{\bar{x}}_k - x_k| &< 0.5\sigma_k, \\ |\bar{\bar{y}}_k - y_k| &< 0.5d\varepsilon_k \mu^{-m_k}. \end{aligned}$$

Последние неравенства показывают, что  $(\bar{\bar{x}}_k, \bar{\bar{y}}_k) \in B_k$ .

Выберем произвольную точку  $(x, y) \in \bar{B}_k$ , ясно, что

$$\begin{aligned} x &= x_k + u, y = y_k + v, \\ |u| &\leq \sigma_k, |v| \leq d\varepsilon_k \mu^{-m_k}. \end{aligned}$$

Пусть

$$\begin{aligned} \bar{u} &= \lambda^{m_k} u, \bar{v} = \mu^{m_k} v, \\ \begin{pmatrix} \bar{\bar{x}} \\ \bar{\bar{y}} \end{pmatrix} &= Lf^{m_k} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

Учитывая (1.5), (1.11), имеем

$$\begin{aligned}\bar{x} &= x^0 + a(\bar{x}_k + \bar{u}) + b(\sigma_k + \bar{v}) + \varphi(\bar{x}_k + \bar{u}, \sigma_k + \bar{v}), \\ \bar{y} &= c(\bar{x}_k + \bar{u}) + g(\sigma_k + \bar{v}) + \psi(\bar{x}_k + \sigma_k),\end{aligned}$$

таким образом, получим

$$\begin{aligned}\bar{x} &= \bar{x}_k + a\bar{u} + b\bar{v} + \varphi(\bar{x}_k + \bar{u}, \sigma_k + \bar{v}) - \varphi(\bar{x}_k, \sigma_k) \\ \bar{y} &= \bar{y}_k + c\bar{u} + g(\sigma_k + \bar{v}) - g(\sigma_k) + \psi(\bar{x}_k + \bar{u}) - \psi(\bar{x}_k)\end{aligned}$$

Зафиксируем номер  $k$  и применим теорему о среднем значении к функциям  $\varphi$ ,  $\psi$ ,  $g$

$$\begin{aligned}\varphi(\bar{x}_k + \bar{u}, \sigma_k + \bar{v}) - \varphi(\bar{x}_k, \sigma_k) &= \frac{\partial \varphi(\bar{x}_k + \theta_1 \bar{u}, \sigma_k + \theta_2 \bar{v})}{\partial x} \bar{u} + \frac{\partial \varphi(\bar{x}_k + \theta_1 \bar{u}, \sigma_k + \theta_2 \bar{v})}{\partial y} \bar{v}, \\ \psi(\bar{x}_k + \bar{u}) - \psi(\bar{x}_k) &= \psi'(\bar{x}_k + \theta_3 \bar{u}) \bar{u}, \\ g(\sigma_k + \bar{v}) - g(\sigma_k) &= g'(\sigma_k + \theta_4 \bar{v}) \bar{v}, \\ 0 \leq \theta_i \leq 1, i &= 1, 2, 3, 4.\end{aligned}$$

Учитывая определение  $u$ ,  $v$ , свойства функций  $\varphi$ ,  $\psi$  и условия (1.10), получим

$$\begin{aligned}|\bar{x} - \bar{x}_k| &\leq (|a| + M) \lambda^{m_k} \sigma_k + (|b| + M) d \varepsilon_k, \\ |\bar{y} - \bar{y}_k| &\leq (|c| + M) \lambda^{m_k} \sigma_k + \mu^{-\alpha m_k} d \varepsilon_k.\end{aligned}$$

Из условий (1.7), (1.8), (1.10) имеем

$$\begin{aligned}d &\leq 0.25(|b| + M), \\ \lambda^{m_k} &< \mu^{-m_k} \varepsilon_k, \\ \mu^{-(\alpha-1)m_k} &< 0.25, \\ 0 &< \varepsilon_k < \sigma_k.\end{aligned}$$

В результате получим

$$\begin{aligned}|\bar{x} - x_k| &\leq |\bar{x} - \bar{x}_k| + |\bar{x}_k - x_k| < \sigma_k, \\ |\bar{y} - y_k| &\leq |\bar{y} - \bar{y}_k| + |\bar{y}_k - y_k| < d \varepsilon_k \mu^{-m_k}.\end{aligned}$$

Последние неравенства доказывают лемму.

**Теорема 1.1.** Пусть выполнены условия (1.1)-(1.12), тогда диффеоморфизм  $f$  имеет счетное множество устойчивых периодических точек с характеристическими показателями, отделенными от нуля.

**Доказательство.** Из леммы 1.1 следует, что при достаточно большом номере  $k$  множество  $B_k$  содержит неподвижную точку отображения  $Lf^{m_k}$ , которая является периодической точкой диффеоморфизма  $f$  с периодом  $(n + m_k)$ . Обозначим такие точки через  $(x_k^*, y_k^*)$  и оценим их характеристические показатели.

Введем следующие обозначения

$$\begin{aligned} \begin{pmatrix} \bar{x}_k^* \\ \bar{y}_k^* \end{pmatrix} &= f^{m_k} \begin{pmatrix} x_k^* \\ y_k^* \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \lambda^{m_k} x_k^* \\ \mu^{m_k} y_k^* \end{pmatrix}, \\ a_k &= a + \frac{\partial \varphi(\bar{x}_k^*, \bar{y}_k^* - y^0)}{\partial x}, \\ b_k &= b + \frac{\partial \varphi(\bar{x}_k^*, \bar{y}_k^* - y^0)}{\partial y}, \\ c_k &= c + \psi'(\bar{x}_k^*), \\ g_k &= g'(\bar{y}_k^* - y^0). \end{aligned}$$

Легко видеть, что

$$|(\bar{y}_k^* - y^0) - \sigma_k| < \varepsilon_k,$$

откуда, учитывая свойства функций  $\varphi$ ,  $\psi$ ,  $g$ , получим

$$\begin{aligned} \lim_{k \rightarrow \infty} a_k &= a, \\ \lim_{k \rightarrow \infty} b_k &= b, \\ \lim_{k \rightarrow \infty} c_k &= c, \\ \lim_{k \rightarrow \infty} g_k &= 0. \end{aligned}$$

Обозначим

$$Z_k = DLf^{m_k} \begin{pmatrix} x_k^* \\ y_k^* \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \lambda^{m_k} a_k & \mu^{m_k} b_k \\ \lambda^{m_k} c_k & \mu^{m_k} g_k \end{pmatrix}.$$

Пусть  $\rho_i(k), i=1,2$ , – собственные числа матрицы  $Z_k$ . Ясно, что

$$\rho_i(k) = 0.5 \text{Tr} Z_k \pm 0.5 \left( (\text{Tr} Z_k)^2 - 4 \det Z_k \right)^{0.5},$$

$$i=1,2,$$

где  $\text{Tr} Z_k$  – след матрицы  $Z_k$ , точнее,  $\text{Tr} Z_k = \lambda^{m_k} a_k + \mu^{m_k} g_k$ .

Предположим, что для бесконечного числа номеров  $k$  справедливо неравенство

$$(\text{Tr} Z_k)^2 - 4 \det Z_k < 0. \quad (1.13)$$

В этом случае  $\rho_i(k), i=1,2$ , являются комплексно сопряженными величинами, поэтому

$$|\rho_i(k)| = (\det Z_k)^{0.5} = (\lambda \mu)^{0.5 m_k} (a_k g_k - b_k c_k)^{0.5},$$

$$i=1,2,$$

при этом

$$\lim_{k \rightarrow \infty} (a_k g_k - b_k c_k)^{0.5} = (-bc)^{0.5} > 0.$$

Известно, что характеристические показатели точек  $(x_k^*, y_k^*)$  определяются как

$$v_i(k) = (m_k + n)^{-1} \ln |\rho_i(k)|,$$

$$i=1,2.$$

Предположим, что неравенства (1.13) справедливы для всех  $k$ , начиная с некоторого номера, тогда получаем, что

$$\lim_{k \rightarrow \infty} v_i(k) = 0.5 \ln(\lambda \mu) < 0, i=1,2.$$

Ясно, что последние условия доказывают теорему в случае выполнения условий (1.13).

Предположим, что условия (1.13) не выполняются для всех номеров  $k$  (может быть, начиная с какого-то номера). Таким образом, пусть

$$(\text{Tr}Z_k)^2 - 4 \det Z_k \geq 0, \quad (1.14)$$

тогда  $\rho_i(k), i = 1, 2$ , являются действительными величинами.

Заметим, что неравенства (1.14) могут выполняться только при условии

$$\mu^{-2(\alpha-1)} \geq \lambda\mu.$$

Оценим  $\rho_i(k), i = 1, 2$ , в случае выполнения условий (1.14), получим

$$|\rho_i(k)| \leq |\text{Tr}Z_k| \leq \lambda^{m_k} |a_k| + \mu^{m_k} |g_k|,$$

откуда, с учетом (1.10), имеем

$$|\rho_i(k)| \leq C\mu^{-(\alpha-1)m_k},$$

где  $C$  – положительная постоянная величина, не зависящая от  $k$ .

В результате, получим

$$\begin{aligned} v_i(k) &\leq -(\alpha-1)m_k(m_k+n)^{-1} \ln \mu + (m_k+n)^{-1} \ln C, \\ i &= 1, 2. \end{aligned}$$

Ясно, что при достаточно больших номерах  $k$ , справедливо неравенство

$$\begin{aligned} v_i(k) &\leq -0.5(\alpha-1) \ln \mu, \\ i &= 1, 2. \end{aligned}$$

Последние неравенства завершают доказательство теоремы.

## 1.2 ДИФФЕОМОРФИЗМЫ ПЛОСКОСТИ. ОБЩИЙ СЛУЧАЙ

В этом разделе главы не предполагается, что исходный диффеоморфизм  $f$  плоскости в себя с неподвижной седловой точкой в начале координат является линейным в окрестности начала координат  $V$ .

Предположим, что в этой окрестности  $f$  имеет вид

$$f \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \lambda x + p(x, y) \\ \mu y + q(x, y) \end{pmatrix}, \quad (1.15)$$

где функции  $p$  и  $q$  непрерывно дифференцируемы и удовлетворяют следующим условиям

$$p(0,0) = q(0,0) = 0,$$

$$\frac{\partial p}{\partial x}(0,0) = \frac{\partial p}{\partial y}(0,0) = 0,$$

$$\frac{\partial q}{\partial x}(0,0) = \frac{\partial q}{\partial y}(0,0) = 0.$$

Пусть, как обычно, через  $W^s(0)$  и  $W^u(0)$  обозначены устойчивое и неустойчивое многообразия точки  $0$ . С помощью гладкой замены переменных можно получить, что в  $V$

$$q(x,0) = 0, \quad p(0,y) = 0. \quad (1.16)$$

Из последних условий следует, что в  $V$   $W_{loc}^s(0)$  совпадает с осью  $(0x)$ , а  $W_{loc}^u(0)$  – с осью  $(0y)$ .

Ясно, что  $Df(0)$  имеет следующий вид

$$Df(0) = \begin{pmatrix} \lambda & 0 \\ 0 & \mu \end{pmatrix}.$$

Предположим, что  $0 < \lambda < 1 < \mu$  и выполнено условие (1.2).

Допустим, что существует нетрансверсальная гомоклиническая точка  $w$ , лежащая в  $V$ , т. е.  $w \neq 0$  и  $w \in W^u(0) \cap W^s(0)$ .

Цель раздела – показать, что при определенном способе касания устойчивого и неустойчивого многообразий, а также при некоторых дополнительных условиях, диффеоморфизм  $f$  имеет счетное множество устойчивых периодических точек с отделенными от нуля характеристическими показателями. В предыдущем разделе предполагалось, что  $f$  линеен в окрестности точки  $0$ , однако, известно, что нельзя утверждать, что произвольный диффеоморфизм допускает гладкую линеаризацию в окрестности седловой точки.

Фиксируем положительную величину  $\theta$ , зависящую только от постоянных  $\lambda$  и  $\mu$ , такую что

$$0 < \lambda - \theta < \lambda + \theta < 1 < \mu - \theta < \mu + \theta, (\lambda + \theta)(\mu + \theta) < 1. \quad (1.17)$$

Пусть  $(x^0, 0)$  и  $(0, y^0)$  – точки из орбиты гомоклинической точки, лежащие в  $V$ , предположим, что выполнено условие (1.3) и имеет место включение (1.4).

Из определения гомоклинической точки следует, что существует натуральное число  $n$  такое, что

$$f^n \begin{pmatrix} 0 \\ y^0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x^0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Пусть  $U$  – выпуклая окрестность точки  $(0, y^0)$  такая, что

$$\begin{aligned} U &\subset V_1, \\ f^n(U) &\subset V_1. \end{aligned}$$

Пусть  $L = f^n|_U$ , считаем, что в  $U$  отображение  $L$  задается формулой (1.5), точнее

$$L \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x^0 + ax + b(y - y^0) + \varphi(x, y - y^0) \\ cx + g(y - y^0) + \psi(x) \end{pmatrix},$$

где  $a, b, c$  – постоянные,  $\varphi, \psi, g$  – непрерывно дифференцируемые функции одной или двух переменных, удовлетворяющие следующим условиям

$$\begin{aligned}\varphi(0,0) &= \psi(0) = g(0) = 0, \\ \frac{\partial \varphi}{\partial x}(0,0) &= \frac{\partial \varphi}{\partial y}(0,0) = 0, \\ \psi'(0) &= 0, \\ g'(0) &= 0.\end{aligned}$$

Последнее условие означает, что точка  $(x^0, 0)$  является точкой касания устойчивого и неустойчивого многообразий. Известно, что  $bc < 0$ , предположим, что выполнено условие (1.6).

Пусть  $M$  – положительная постоянная такая, что

$$\begin{aligned}\left| \frac{\partial \varphi}{\partial x}(x, y - y^0) \right| &\leq M, \quad \left| \frac{\partial \varphi}{\partial y}(x, y - y^0) \right| \leq M, \\ |\psi'(x)| &\leq M, \\ (x, y - y^0) &\in U.\end{aligned}$$

Как и в предыдущем разделе, свойства функции  $g$ , которые определяют касание устойчивого и неустойчивого многообразий в точке  $(x^0, 0)$ , опишем с помощью нескольких последовательностей. Пусть  $\sigma_k, \varepsilon_k$  – положительные последовательности, стремящиеся к нулю, кроме того, предположим, что последовательность  $\sigma_k$  убывает. Считаем, что при любом  $k$  выполнены неравенства (1.7). Пусть последовательность  $m_k$  – строго возрастающая последовательность натуральных чисел, т.е.

$$m_{k+1} \geq m_k + 1,$$

при любых  $k$ . Считаем, что  $m_k$  стремится к бесконечности настолько быстро, что выполняется для любого  $k$  следующее условие



$$(\lambda + \theta)^{m_k} (\mu + \theta)^{m_k} < \varepsilon_k. \quad (1.18)$$

Обозначим через  $d$  следующую величину

$$d = \min \left[ 0.25, 0.25(|b| + M)^{-1} \right].$$

Пусть  $r_k = (x_k, y_k)$  последовательность точек, лежащих в  $V_1$ , таких, что

$$x_k = \frac{x^0 + b\sigma_k}{1 - \lambda^{m_k} a},$$

$$y_k = \frac{y^0 + \sigma_k}{\mu^{m_k}}.$$

Предположим, что непрерывно дифференцируемая в окрестности нуля функция  $g$  такова, что  $g(0) = g'(0) = 0$ , кроме того выполнены следующие неравенства

$$|g(\sigma_k) + \lambda^{m_k} c x_k - y_k| < 0.25 d \varepsilon_k (\mu + \theta)^{-m_k}; \quad (1.19)$$

существует положительная  $\alpha > 1$ , такая что

$$|g'(t)| < (\mu + \theta)^{-\alpha m_k}, \quad (1.20)$$

при любых  $t \in (\sigma_k - \varepsilon_k, \sigma_k + \varepsilon_k)$ .

Условия (1.19), (1.20) определяют характер касания устойчивого и неустойчивого многообразий в точке  $(x^0, 0)$ , ясно, что характер касания аналогичен касанию, описанному в предыдущем разделе.

Из условий (1.19), (1.20) следует, что

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \frac{g(\sigma_k)}{\sigma_k} = \lim_{k \rightarrow \infty} (\mu^{m_k} \sigma_k)^{-1} = \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{\lambda^{m_k}}{\sigma_k} = 0.$$

Зафиксируем  $A_0$  выпуклую окрестность точки  $(x^0, 0)$  такую, что

$$A_0 \subset f^n(U) \subset V_1,$$

$$f(A_0) \cap A_0 = \emptyset.$$

Рассмотрим последовательность образов  $f^j(A_0)$ , где  $j \geq 1$ .

Ясно, что  $f^j \begin{pmatrix} x^0 \\ 0 \end{pmatrix} \in V_1$ , поэтому  $f^j(A_0) \cap V_1 \neq \emptyset$ .

Пусть  $A_j$  – компонента связности множества  $f^j(A_0) \cap V_1$ , содержащая точку  $f^j \begin{pmatrix} x^0 \\ 0 \end{pmatrix}$ .

Определим окрестности точек  $r_k$  следующим образом

$$B_k^0 = \left\{ (x, y) : |x - x_k| < \sigma_k, |y - y_k| < \varepsilon_k d(\mu + \theta)^{-m_k} \right\}.$$

Считаем, что для любого  $k$  справедливо включение

$$B_k^0 \subset A_0, \tag{1.21}$$

заметим, что это условие может выполняться не для всех номеров  $k$ , а только для достаточно больших, в дальнейшем рассматриваются только такие номера  $k$ .

Для каждого фиксированного номера  $k$  определим конечную последовательность множеств

$$B_k^j = \left\{ (x, y) : |x - \lambda^j x_k| < (\lambda + \theta)^j \sigma_k, |y - \mu^j y_k| < \varepsilon_k d(\mu + \theta)^{-m_k + j} \right\},$$

где  $j = 0, 1, \dots, m_k$ .

Считаем, что

$$B_k^j \subset V_1, \tag{1.22}$$

при достаточно больших номерах  $k$  и  $j = 0, 1, \dots, m_k$ .

Обозначим через  $\beta$  и  $\Delta$  следующие положительные величины, удовлетворяющие условиям

$$\begin{aligned} 0 < \Delta < 0.5\theta, \\ \beta > -\frac{\ln(\lambda + \theta)}{\ln(\mu + \theta)}. \end{aligned}$$

Пусть функции  $p$  и  $q$  таковы, что при любых  $k$  выполняются условия

$$\begin{aligned} |p(\lambda^j x_k, \mu^j y_k)| &< 0.5\theta(\lambda + \theta)^j \sigma_k, \\ |q(\lambda^j x_k, \mu^j y_k)| &< 0.5\theta \varepsilon_k d (\mu + \theta)^{-m_k+j}, \end{aligned} \quad (1.23)$$

где  $0 \leq j \leq m_k - 1$ ,

$$\begin{aligned} \left| \frac{\partial p}{\partial x}(x, y) \right| &< \Delta, \\ \left| \frac{\partial q}{\partial y}(x, y) \right| &< \Delta, \\ \left| \frac{\partial p}{\partial y}(x, y) \right| &< (\mu + \theta)^{-\beta m_k}, \end{aligned} \quad (1.24)$$

$$\begin{aligned} \left| \frac{\partial q}{\partial x}(x, y) \right| &< (\mu + \theta)^{-\beta m_k}, \\ (x, y) &\in B_k^j, 0 \leq j \leq m_k - 1. \end{aligned}$$

Из условий (1.24) следует

$$\begin{aligned} p(\lambda^j x^0, 0) &= q(\lambda^j x^0, 0) = 0, \\ \frac{\partial p}{\partial y}(\lambda^j x^0, 0) &= \frac{\partial q}{\partial x}(\lambda^j x^0, 0) = 0' \end{aligned}$$

последние равенства означают, что точки  $(\lambda^j x^0, 0)$ , при  $j \geq 0$ , принадлежат орбите гомоклинической точки, причем характер касания устойчивого и неустойчивого многообразий в этих точках аналогичен касанию этих многообразий в точке  $(x^0, 0)$ . Отметим, что в разделе 1 данной главы предполагалось, что функции  $p, q$  тождественно равны нулю в  $V$ , поэтому условия (1.23), (1.24) для этих функций выполняются, однако, не каждый диффеоморфизм допускает гладкую линеаризацию в окрестности седловой точки, поэтому общий случай рассматривается отдельно.

Прежде чем доказывать основное утверждение раздела докажем несколько вспомогательных лемм.

**Лемма 1.2.** Пусть выполнены условия (1.2)-(1.7), (1.15)-(1.24), тогда при достаточно больших номерах  $k$  справедливо следующее включение

$$f(\bar{B}_k^j) \subset \bar{B}_k^{j+1}, j = 0, 1, \dots, m_k - 1. \quad (1.25)$$

**Доказательство.** Пусть натуральная величина  $k$  настолько велика, что выполнено (1.22). Кроме того, считаем, что выполнены неравенства

$$\begin{aligned} \sigma_k &< 0.5\theta - \Delta, \\ [(\lambda + \theta)(\mu + \theta)^\beta]^{-m_k} &< 0.5\theta - \Delta. \end{aligned} \quad (1.26)$$

Фиксируем произвольную точку  $(x, y) \in \bar{B}_k^0$ . Ясно, что ее можно представить как

$$x = x_k + u, y = y_k + v,$$

где

$$|u| \leq \sigma_k, |v| \leq \varepsilon_k d(\mu + \theta)^{-m_k}.$$

Пусть

$$\begin{pmatrix} \bar{x} \\ \bar{y} \end{pmatrix} = f \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix},$$

тогда

$$\bar{x} = \lambda(x_k + u) + p(x_k + u, y_k + v) - p(x_k, y_k) + p(x_k, y_k).$$

Используя условия (1.23), (1.24), а также теорему о среднем значении функции, получим

$$\begin{aligned} |\bar{x} - \lambda x_k| &\leq \lambda |u| + |p(x_k, y_k)| + |p(x_k + u, y_k + v) - p(x_k, y_k)| < \\ &< \lambda |u| + 0.5\theta \sigma_k + \left| \frac{\partial p}{\partial x}(x_k + \xi_1 u, y_k + \xi_2 v) \right| |u| + \left| \frac{\partial p}{\partial y}(x_k + \xi_1 u, y_k + \xi_2 v) \right| |v|, \end{aligned}$$

$$\text{где } 0 \leq \xi_1 \leq 1, 0 \leq \xi_2 \leq 1,$$

откуда

$$|\bar{x} - \lambda x_k| < (\lambda + 0.5\theta + \Delta) \sigma_k + \varepsilon_k d(\mu + \theta)^{-\beta m_k}.$$

Пусть  $k$  настолько велика, что

$$d(\mu + \theta)^{-\beta m_k} < 0.5\theta - \Delta,$$

$$0 < \varepsilon_k < \sigma_k,$$

поэтому, при таких  $k$  имеем

$$|\bar{x} - \lambda x_k| < (\lambda + \theta)\sigma_k. \quad (1.27)$$

Аналогично,

$$\bar{y} = \mu(y_k + v) + q(x_k + u, y_k + v) - q(x_k, y_k) + q(x_k, y_k),$$

оценим, используя теорему о среднем значении и условия (1.23), (1.24), получим

$$|\bar{y} - \mu y_k| \leq \mu|v| + |q(x_k, y_k)| + |q(x_k + u, y_k + v) - q(x_k, y_k)| <$$

$$< \mu|v| + 0.5\theta\varepsilon_k d(\mu + \theta)^{-m_k} + \left| \frac{\partial q}{\partial x}(x_k + \xi_1 u, y_k + \xi_2 v) \right| |u| + \left| \frac{\partial q}{\partial y}(x_k + \xi_1 u, y_k + \xi_2 v) \right| |v|$$

где  $0 \leq \xi_1 \leq 1, 0 \leq \xi_2 \leq 1$ .

В результате

$$|\bar{y} - \mu y_k| < (\mu + 0.5\theta + \Delta)\varepsilon_k d(\mu + \theta)^{-m_k} + \sigma_k (\mu + \theta)^{-\beta m_k}.$$

В силу условий (1.17), (1.18) имеем для больших значений  $k$

$$\varepsilon_k d(\mu + \theta)^{-m_k} > d(\lambda + \theta)^{m_k} > d(\mu + \theta)^{-\beta m_k} > (0.5\theta - \Delta)^{-1} \sigma_k (\mu + \theta)^{-\beta m_k}, \quad (1.28)$$

окончательно имеем

$$|\bar{y} - \mu y_k| < (\mu + \theta)\varepsilon_k d(\mu + \theta)^{-m_k}.$$

Последние неравенства и неравенства (1.27) показывают, что справедливо включение

$$f(\bar{B}_k^0) \subset B_k^1.$$

Рассмотрим общий случай.

Пусть

$$(x, y) \in \bar{B}_k^j, 0 \leq j \leq m_k - 1.$$

Ясно, что

$$\begin{aligned}x &= \lambda^j x_k + u, \\y &= \mu^j y_k + v, \\|u| &\leq (\lambda + \theta)^j \sigma_k, \\|v| &\leq \varepsilon_k d (\mu + \theta)^{-m_k + j}\end{aligned}$$

Пусть, как и в предыдущем случае,

$$\begin{pmatrix} \bar{x} \\ \bar{y} \end{pmatrix} = f \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix},$$

откуда

$$\bar{x} = \lambda(\lambda^j x_k + u) + p(\lambda^j x_k + u, \mu^j y_k + v) - p(\lambda^j x_k, \mu^j y_k) + p(\lambda^j x_k, \mu^j y_k).$$

Аналогично, применяя теорему о среднем значении и условия (1.23), (1.24), получим

$$\begin{aligned}|\bar{x} - \lambda^{j+1} x_k| &\leq \lambda |u| + |p(\lambda^j x_k, \mu^j y_k)| + |p(\lambda^j x_k + u, \mu^j y_k + v) - p(\lambda^j x_k, \mu^j y_k)| < \\&< \lambda |u| + 0.5\theta(\lambda + \theta)^j \sigma_k + \left| \frac{\partial p}{\partial x}(\lambda^j x_k + \xi_1 u, \mu^j y_k + \xi_2 v) \right| |u| + \\&+ \left| \frac{\partial p}{\partial y}(\lambda^j x_k + \xi_1 u, \mu^j y_k + \xi_2 v) \right| |v|,\end{aligned}$$

где  $0 \leq \xi_1 \leq 1, 0 \leq \xi_2 \leq 1$ , откуда

$$|\bar{x} - \lambda^{j+1} x_k| < (\lambda + 0.5\theta + \Delta)(\lambda + \theta)^j \sigma_k + (\mu + \theta)^{-\beta m_k} \varepsilon_k d (\mu + \theta)^{-m_k + j}.$$

Используя условия (1.17), (1.18), имеем

$$\begin{aligned}(\mu + \theta)^{-\beta m_k} \varepsilon_k d (\mu + \theta)^{-m_k + j} &< \sigma_k (\mu + \theta)^{-\beta m_k} (\mu + \theta)^{-m_k + j} < \\&< (0.5\theta - \Delta) \sigma_k (\lambda + \theta)^{m_k} (\mu + \theta)^{-m_k + j} < (0.5\theta - \Delta) \sigma_k (\lambda + \theta)^j,\end{aligned}$$

таким образом

$$|\bar{x} - \lambda^{j+1} x_k| < (\lambda + \theta)^{j+1} \sigma_k. \quad (1.29)$$

Аналогично,

$$\bar{y} = \mu(\mu^j y_k + v) + q(\lambda^j x_k + u, \mu^j y_k + v) - q(\lambda^j x_k, \mu^j y_k) + q(\lambda^j x_k, \mu^j y_k),$$

откуда

$$\begin{aligned} |\bar{y} - \mu^{j+1} y_k| &\leq \mu |v| + |q(\lambda^j x_k, \mu^j y_k)| + |q(\lambda^j x_k + u, \mu^j y_k + v) - q(\lambda^j x_k, \mu^j y_k)| < \\ &< \mu |v| + 0.5\theta \varepsilon_k d (\mu + \theta)^{-m_k + j} + \left| \frac{\partial q}{\partial x}(\lambda^j x_k + \xi_1 u, \mu^j y_k + \xi_2 v) \right| |u| + \\ &+ \left| \frac{\partial q}{\partial y}(\lambda^j x_k + \xi_1 u, \mu^j y_k + \xi_2 v) \right| |v|, \end{aligned}$$

где  $0 \leq \xi_1 \leq 1, 0 \leq \xi_2 \leq 1$ , следовательно,

$$|\bar{y} - \mu^{j+1} y_k| < (\mu + 0.5\theta + \Delta) \varepsilon_k d (\mu + \theta)^{-m_k + j} + (\lambda + \theta)^j \sigma_k (\mu + \theta)^{-\beta m_k}.$$

Из неравенства (1.28) следует

$$(\lambda + \theta)^j \sigma_k (\mu + \theta)^{-\beta m_k} < (0.5\theta - \Delta) \varepsilon_k d (\mu + \theta)^{-m_k + j}.$$

Окончательно получим

$$|\bar{y} - \mu^{j+1} y_k| < \varepsilon_k d (\mu + \theta)^{-m_k + j+1}.$$

Последние неравенства и неравенства (1.29) доказывают лемму.

Из леммы 1.2 следуют включения

$$\begin{aligned} B_k^j &\subset A_j, \quad j = 0, 1, \dots, m_k, \\ f^{m_k}(\bar{B}_k^0) &\subset B_k^{m_k} \subset A_{m_k}. \end{aligned}$$

Рассмотрим подробнее

$$B_k^{m_k} = \left\{ (x, y) : |x - \lambda^{m_k} x_k| < (\lambda + \theta)^{m_k} \sigma_k, |y - \mu^{m_k} y_k| < \varepsilon_k d \right\},$$

в дальнейшем, считаем  $k$  настолько большой, что

$$\bar{B}_k^{m_k} \subset U. \tag{1.30}$$

**Лемма 1.3.** Пусть выполнены условия (1.2)-(1.7), (1.15)-(1.24), (1.30), тогда при достаточно больших  $k$  справедливы следующие включения

$$L(\bar{B}_k^{m_k}) \subset B_k^0. \tag{1.31}$$

**Доказательство.** Обозначим

$$\begin{aligned}\bar{x}_k &= \lambda^{m_k} x_k = \lambda^{m_k} \frac{x^0 + b\sigma_k}{1 - \lambda^{m_k} a}, \\ \bar{y}_k &= \mu^{m_k} y_k = y^0 + \sigma_k, \\ \begin{pmatrix} \bar{\bar{x}}_k \\ \bar{\bar{y}}_k \end{pmatrix} &= L \begin{pmatrix} \bar{x}_k \\ \bar{y}_k \end{pmatrix}.\end{aligned}$$

Из определения  $L$  имеем

$$\begin{aligned}\bar{\bar{x}}_k &= x^0 + a\bar{x}_k + b\sigma_k + \varphi(\bar{x}_k, \sigma_k), \\ \bar{\bar{y}}_k &= c\bar{x}_k + g(\sigma_k) + \psi(\bar{x}_k).\end{aligned}$$

Легко видеть, что

$$x_k = x^0 + a\bar{x}_k + b\sigma_k,$$

таким образом

$$|\bar{\bar{x}}_k - x_k| = |\varphi(\bar{x}_k, \sigma_k)|.$$

Применив теорему о среднем значении, получим

$$\varphi(\bar{x}_k, \sigma_k) = \frac{\partial \varphi}{\partial x}(\xi_1 \bar{x}_k, \xi_2 \sigma_k) \bar{x}_k + \frac{\partial \varphi}{\partial y}(\xi_1 \bar{x}_k, \xi_2 \sigma_k) \sigma_k,$$

где  $0 \leq \xi_1 \leq 1, 0 \leq \xi_2 \leq 1$ .

Обозначим

$$\begin{aligned}\Delta_{1k} &= \left| \frac{\partial \varphi}{\partial x}(\xi_1 \bar{x}_k, \xi_2 \sigma_k) \right|, \\ \Delta_{2k} &= \left| \frac{\partial \varphi}{\partial y}(\xi_1 \bar{x}_k, \xi_2 \sigma_k) \right|.\end{aligned}$$

Ясно, что

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \Delta_{1k} = \lim_{k \rightarrow \infty} \Delta_{2k} = 0,$$

$$|\varphi(\bar{x}_k, \sigma_k)| \leq \Delta_{1k} |\bar{x}_k| + \Delta_{2k} \sigma_k,$$



$$|\bar{x}_k| < 0.25\sigma_k.$$

Пусть величина  $k$  такова, что

$$\Delta_{1k} < 1, \Delta_{2k} < 0.25,$$

тогда

$$|\bar{\bar{x}}_k - x_k| < 0.5\sigma_k. \quad (1.32)$$

Далее, применим теорему Лагранжа к функции  $\psi$ , т.е.

$$\begin{aligned} \psi(\bar{x}_k) &= \psi'(\xi_3 \bar{x}_k) \bar{x}_k, \\ 0 &\leq \xi_3 \leq 1. \end{aligned}$$

Обозначим

$$\Delta_{3k} = |\psi'(\xi_3 \bar{x}_k)|.$$

Ясно, что эта последовательность стремится к нулю, если  $k$  стремится к бесконечности, поэтому считаем, что  $\Delta_{3k} < 1$ .

Следовательно, имеем

$$|\bar{\bar{y}}_k - y_k| \leq |c\bar{x}_k + g(\sigma_k) - y_k| + |\psi(\sigma_k)| < 0.25\varepsilon_k d(\mu + \theta)^{-m_k} + \Delta_{3k} |\bar{x}_k|.$$

Из (1.18) следует

$$\lambda^{m_k} < \varepsilon_k (\mu + \theta)^{-m_k} (1 + \theta\lambda^{-1})^{-m_k},$$

откуда, при достаточно больших значениях  $k$  получим

$$|\bar{\bar{y}}_k - y_k| < 0.5\varepsilon_k d(\mu + \theta)^{-m_k}.$$

Из последних неравенств и неравенства (1.32) следует

$$(\bar{\bar{x}}_k, \bar{\bar{y}}_k) \in B_k^0.$$

Пусть величина  $k$  такова, что имеют место последние включения, возьмем произвольную точку

$$(x, y) \in \bar{B}_k^{m_k}.$$

Ясно, что

$$\begin{aligned} x &= \bar{x}_k + u, y = \bar{y}_k + v, \\ |u| &\leq (\lambda + \theta)^{m_k} \sigma_k, |v| \leq \varepsilon_k d. \end{aligned}$$

Обозначим

$$\begin{pmatrix} \bar{\bar{x}} \\ \bar{\bar{y}} \end{pmatrix} = L \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix},$$

где

$$\begin{aligned} \bar{\bar{x}} &= x^0 + a(\bar{x}_k + u) + b(\sigma_k + v) + \varphi(\bar{x}_k + u, \sigma_k + v), \\ \bar{\bar{y}} &= c(\bar{x}_k + u) + g(\sigma_k + v) + \psi(\bar{x}_k + u). \end{aligned}$$

Оценим разность

$$|\bar{\bar{x}} - x_k| \leq |\bar{\bar{x}} - \bar{x}_k| + |\bar{x}_k - x_k|,$$

точнее

$$|\bar{\bar{x}} - \bar{x}_k| \leq |au| + |bv| + |\varphi(\bar{x}_k + u, \sigma_k + v) - \varphi(\bar{x}_k, \sigma_k)|.$$

Еще раз, применив теорему о среднем значении, получим

$$|\varphi(\bar{x}_k + u, \sigma_k + v) - \varphi(\bar{x}_k, \sigma_k)| \leq \left| \frac{\partial \varphi}{\partial x}(\bar{x}_k + \xi_1 u, \sigma_k + \xi_2 v) \right| |u| + \left| \frac{\partial \varphi}{\partial y}(\bar{x}_k + \xi_1 u, \sigma_k + \xi_2 v) \right| |v|$$

где  $0 \leq \xi_1 \leq 1, 0 \leq \xi_2 \leq 1$ , откуда

$$|\bar{\bar{x}} - \bar{x}_k| \leq (|a| + M)|u| + (|b| + M)|v| \leq (|a| + M)(\lambda + \theta)^{m_k} \sigma_k + (|b| + M)\varepsilon_k d,$$

следовательно, при достаточно больших значениях  $k$ , получим

$$|\bar{\bar{x}} - x_k| < \sigma_k. \quad (1.33)$$

Аналогично, оценим разность

$$|\bar{\bar{y}} - y_k| \leq |\bar{\bar{y}} - \bar{y}_k| + |\bar{y}_k - y_k|,$$

точнее

$$|\bar{\bar{y}} - \bar{y}_k| \leq |cu| + |g(\sigma_k + v) - g(\sigma_k)| + |\psi(\bar{x}_k + u) - \psi(\bar{x}_k)|.$$

Применяя теорему Лагранжа к функциям  $\psi$  и  $g$ , а также, учитывая условия (1.20), имеем

$$|\bar{\bar{y}} - \bar{y}_k| \leq (|c| + M)|u| + (\mu + \theta)^{-\alpha m_k} |v|.$$

Используя условия (1.18), получим, что при достаточно больших значениях  $k$ , справедливо следующее неравенство

$$|\bar{y} - y_k| < \varepsilon_k d (\mu + \theta)^{-m_k}.$$

Последние неравенства и неравенства (1.33) доказывают лемму.

**Лемма 1.4.** *Дана последовательность матриц второго порядка*

$$\begin{pmatrix} \alpha_{11}(l) & \alpha_{12}(l) \\ \alpha_{21}(l) & \alpha_{22}(l) \end{pmatrix}, \\ l = 1, 2, \dots,$$

пусть  $|\alpha_{ij}(l)| \leq \beta_{ij}$ , где  $i=1,2, j=1,2, l=1,2, \dots$ . Обозначим через

$$\prod_{l=1}^k \begin{pmatrix} \alpha_{11}(l) & \alpha_{12}(l) \\ \alpha_{21}(l) & \alpha_{22}(l) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \gamma_{11}(k) & \gamma_{12}(k) \\ \gamma_{21}(k) & \gamma_{22}(k) \end{pmatrix}, \\ \begin{pmatrix} \beta_{11} & \beta_{12} \\ \beta_{21} & \beta_{22} \end{pmatrix}^k = \begin{pmatrix} \delta_{11}(k) & \delta_{12}(k) \\ \delta_{21}(k) & \delta_{22}(k) \end{pmatrix},$$

тогда

$$|\gamma_{ij}(k)| \leq \delta_{ij}(k), \text{ где } i=1,2, j=1,2, k=1,2, \dots$$

**Доказательство.** Доказательство проведем с помощью метода математической индукции. При  $k=1$  утверждение очевидно, следовательно, база индукции установлена. Докажем индукционный переход, используя следующие очевидные соотношения

$$\gamma_{ij}(k+1) = \gamma_{i1}(k)\alpha_{1j}(k+1) + \gamma_{i2}(k)\alpha_{2j}(k+1), \\ \delta_{ij}(k+1) = \delta_{i1}(k)\beta_{1j} + \delta_{i2}(k)\beta_{2j}.$$

Применив индукционное предположение, получим

$$|\gamma_{ij}(k+1)| \leq |\gamma_{i1}(k)| |\alpha_{1j}(k+1)| + |\gamma_{i2}(k)| |\alpha_{2j}(k+1)| \leq \delta_{i1}(k)\beta_{1j} + \delta_{i2}(k)\beta_{2j},$$

где  $I = 1, 2, j = 1, 2$ .

Лемма 1.4 доказана.

**Лемма 1.5.** Пусть  $0 < \lambda < 1 < \mu < \gamma$ ,  $\lambda\mu < 1$ ,  $\lambda\gamma > 1$ ,  $\tau = \max[\lambda, \mu\gamma^{-2}]$ , тогда

$$\begin{pmatrix} \lambda & \gamma^{-k} \\ \gamma^{-k} & \mu \end{pmatrix}^k = \begin{pmatrix} \tau^k (c_1 + \delta_1(k)) & (\mu\gamma^{-1})^k (c_2 + \delta_2(k)) \\ (\mu\gamma^{-1})^k (c_2 + \delta_2(k)) & \mu^k (1 + \delta_3(k)) \end{pmatrix},$$

где  $c_1, c_2$  – постоянные, а  $\delta_1(k), \delta_2(k), \delta_3(k)$  – бесконечно малые при  $k \rightarrow \infty$ .

**Доказательство.** Найдем собственные числа матрицы

$$A = \begin{pmatrix} \lambda & \gamma^{-k} \\ \gamma^{-k} & \mu \end{pmatrix},$$

ясно, что они имеют следующий вид

$$\begin{aligned} \rho_1 &= 0.5(\lambda + \mu) - 0.5(\mu - \lambda) \left(1 + 4(\mu - \lambda)^{-2} \gamma^{-2k}\right)^{0.5}, \\ \rho_2 &= 0.5(\lambda + \mu) + 0.5(\mu - \lambda) \left(1 + 4(\mu - \lambda)^{-2} \gamma^{-2k}\right)^{0.5}, \end{aligned}$$

или, учитывая известную формулу,

$$(1 + x)^{0.5} = 1 + 0.5x(1 + \alpha(x)),$$

где  $\lim_{x \rightarrow 0} \alpha(x) = 0$ , получим

$$\begin{aligned} \rho_1 &= \lambda - (\mu - \lambda)^{-1} \gamma^{-2k} (1 + \alpha(k)), \\ \rho_2 &= \mu + (\mu - \lambda)^{-1} \gamma^{-2k} (1 + \alpha(k)), \end{aligned}$$

где  $\alpha(k)$  – бесконечно малая.

Известно, что

$$A^k = T J^k T^{-1},$$

где  $J$  – каноническая жорданова форма матрицы  $A$ , а  $T$  – матрица перехода.

Легко видеть, что

$$J = \begin{pmatrix} \rho_1 & 0 \\ 0 & \rho_2 \end{pmatrix},$$

$$T = \begin{pmatrix} \gamma^{-k} & \rho_2 - \mu \\ \rho_1 - \lambda & \gamma^{-k} \end{pmatrix},$$

$$T^{-1} = (\det T)^{-1} \begin{pmatrix} \gamma^{-k} & \mu - \rho_2 \\ \lambda - \rho_1 & \gamma^{-k} \end{pmatrix},$$

$$\det T = \gamma^{-2k} - (\rho_1 - \lambda)(\rho_2 - \mu) = \gamma^{-2k} \left[ 1 + \gamma^{-2k} (\mu - \lambda)^{-2} (1 + \alpha(k))^2 \right],$$

таким образом

$$(\det T)^{-1} = \gamma^{2k} (1 + \delta(k)),$$

где  $\delta(k)$  – бесконечно малая.

В результате вычислений получим

$$A^k = (\det T)^{-1} \begin{pmatrix} \gamma^{-2k} \rho_1^k + (\rho_2 - \mu)(\lambda - \rho_1) \rho_2^k & \gamma^{-k} (\rho_2 - \mu)(\rho_2^k - \rho_1^k) \\ \gamma^{-k} (\lambda - \rho_1)(\rho_2^k - \rho_1^k) & \gamma^{-2k} \rho_2^k + (\rho_1 - \lambda)(\mu - \rho_2) \rho_1^k \end{pmatrix}.$$

Рассмотрим

$$\rho_1^k = \left[ \lambda - (\mu - \lambda) \gamma^{-2k} (1 + \alpha(k)) \right]^k = \lambda^k \left[ 1 - \lambda^{-1} (\mu - \lambda)^{-1} \gamma^{-2k} (1 + \alpha(k)) \right]^k,$$

легко видеть, что

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \left[ 1 - \lambda^{-1} (\mu - \lambda)^{-1} \gamma^{-2k} (1 + \alpha(k)) \right]^k = 1,$$

откуда

$$\rho_1^k = \lambda^k (1 + \beta_1(k)),$$

где  $\beta_1(k)$  – бесконечно малая.

Аналогично получим

$$\rho_2^k = \mu^k (1 + \beta_2(k)),$$

$$\rho_2^k - \rho_1^k = \mu^k (1 + \beta_3(k)),$$

где  $\beta_2(k), \beta_3(k)$  – бесконечно малые.

Обозначим элементы матрицы

$$A^k = \{a_{ij}(k)\}, i = 1, 2, j = 1, 2,$$

тогда

$$\begin{aligned} a_{11}(k) &= (1 + \delta(k)) \left[ \lambda^k (1 + \beta_1(k)) + (\mu\gamma^{-2})^k (\mu - \lambda)^{-2} (1 + \alpha(k))^2 (1 + \beta_2(k)) \right], \\ a_{12}(k) &= a_{21}(k) = (1 + \delta(k)) (\mu\gamma^{-1})^k (\mu - \lambda)^{-1} (1 + \alpha(k)) (1 + \beta_3(k)), \\ a_{22}(k) &= (1 + \delta(k)) \left[ \mu^k (1 + \beta_3(k)) + (\lambda\gamma^{-2})^k (\mu - \lambda)^{-2} (1 + \alpha(k))^2 (1 + \beta_1(k)) \right]. \end{aligned}$$

Ясно, что из последних соотношений следует утверждение леммы 1.5.

**Теорема 1.2.** Пусть выполнены условия (1.2) - (1.7), (1.15) - (1.24), (1.30), (1.31), тогда диффеоморфизм  $f$  имеет счетное множество устойчивых периодических точек с характеристическими показателями, отделенными от нуля.

**Доказательство.** Из лемм 1.2, 1.3 следует, что для достаточно больших номеров  $k$  справедливо включение

$$Lf^{m_k}(\bar{B}_k^0) \subset B_k^0.$$

Таким образом, внутри множества  $B_k^0$  лежит неподвижная точка отображения  $Lf^{m_k}$ , которая является периодической точкой диффеоморфизма  $f$  с периодом  $n + m_k$ . Обозначим эти точки  $(x_{k0}, y_{k0})$ , кроме того, для каждой такой точки при фиксированном  $k$  рассмотрим точки из ее орбиты

$$\begin{pmatrix} x_{kj} \\ y_{kj} \end{pmatrix} = f^j \begin{pmatrix} x_{k0} \\ y_{k0} \end{pmatrix}, j = 1, 2, \dots, m_k.$$

Ясно, что  $(x_{kj}, y_{kj}) \in B_k^j, j = 0, 1, \dots, m_k$ .

Пусть

$$a_k = a + \frac{\partial \varphi}{\partial x}(x_{km_k}, y_{km_k} - y^0),$$

$$b_k = b + \frac{\partial \varphi}{\partial y}(x_{km_k}, y_{km_k} - y^0),$$

$$c_k = c + \psi'(x_{km_k}),$$

$$g_k = g'(y_{km_k} - y^0).$$

Ясно, что  $\lim_{k \rightarrow \infty} a_k = a, \lim_{k \rightarrow \infty} b_k = b, \lim_{k \rightarrow \infty} c_k = c, \lim_{k \rightarrow \infty} g_k = 0$ .

Пусть

$$\Gamma = \begin{pmatrix} \gamma_{11} & \gamma_{12} \\ \gamma_{21} & \gamma_{22} \end{pmatrix} = \prod_{j=0}^{m_k-1} \begin{pmatrix} \lambda + \frac{\partial p}{\partial x}(x_{kj}, y_{kj}) & \frac{\partial p}{\partial y}(x_{kj}, y_{kj}) \\ \frac{\partial q}{\partial x}(x_{kj}, y_{kj}) & \mu + \frac{\partial q}{\partial y}(x_{kj}, y_{kj}) \end{pmatrix},$$

$$Z_k = D L f^{m_k} \begin{pmatrix} x_{k0} \\ y_{k0} \end{pmatrix},$$

тогда

$$Z_k = \begin{pmatrix} a_k & b_k \\ c_k & g_k \end{pmatrix} \Gamma.$$

Наша задача – оценить собственные числа матрицы  $Z_k$ , для этого рассмотрим матрицу

$$\Omega = \begin{pmatrix} \omega_{11} & \omega_{12} \\ \omega_{21} & \omega_{22} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \lambda + \Delta & (\mu + \theta)^{-\beta m_k} \\ (\mu + \theta)^{-\beta m_k} & \mu + \Delta \end{pmatrix}^{m_k},$$

согласно условиям (1.24) и лемме 1.4 для элементов матриц  $\Gamma$  и  $\Omega$  справедливы неравенства

$$|\gamma_{ij}| \leq \omega_{ij}, \text{ где } i=1,2, j=1,2.$$

Обозначим через  $\tau_1, \tau_2$  следующие величины

$$\begin{aligned}\tau_1 &= \max \left[ \lambda + \Delta, (\mu + \Delta)(\mu + \theta)^{-2\beta} \right], \\ \tau_2 &= (\mu + \Delta)(\mu + \theta)^{-\beta}.\end{aligned}$$

Ясно, что

$$0 < \tau_1 < \tau_2 < 1.$$

Применив лемму 1.5, получим

$$\begin{aligned}|\gamma_{11}| &\leq \omega_{11} \leq \tau_1^{m_k} (C_1 + \delta_1(k)), \\ |\gamma_{12}| &\leq \omega_{12} \leq \tau_2^{m_k} (C_2 + \delta_2(k)), \\ |\gamma_{21}| &\leq \omega_{21} \leq \tau_2^{m_k} (C_2 + \delta_2(k)), \\ |\gamma_{22}| &\leq \omega_{22} \leq (\mu + \Delta)^{m_k} (C_3 + \delta_3(k)).\end{aligned}$$

В последних неравенствах  $C_1, C_2, C_3$  – постоянные величины, а  $\delta_1, \delta_2, \delta_3$  – бесконечно малые при  $k \rightarrow \infty$ .

Пусть  $\rho_1, \rho_2$  – собственные числа матрицы  $Z_k$ , ясно, что

$$\begin{aligned}\rho_1 + \rho_2 &= \text{Tr} Z_k = a_k \gamma_{11} + b_k \gamma_{21} + c_k \gamma_{12} + g_k \gamma_{22}, \\ \rho_1 \rho_2 &= \det Z_k = \det \begin{pmatrix} a_k & b_k \\ c_k & g_k \end{pmatrix} \det \Gamma = (a_k g_k - b_k c_k) (\gamma_{11} \gamma_{22} - \gamma_{12} \gamma_{21}).\end{aligned}$$

Очевидно, что  $\gamma_{11}, \gamma_{12}, \gamma_{21}$  и произведения  $g_k \gamma_{22}, \gamma_{11} \gamma_{22}$  являются бесконечно малыми величинами при  $k \rightarrow \infty$ . Последовательности  $a_k, b_k, c_k$  ограничены, поэтому  $(\rho_1 + \rho_2), \rho_1 \rho_2$  – бесконечно малые величины при  $k \rightarrow \infty$ .

Пусть

$$\begin{aligned}z_1 &= \max \left[ \tau_2, (\mu + \Delta)(\mu + \theta)^{-\alpha} \right], \\ z_2 &= \max \left[ (\tau_2)^2, (\lambda + \Delta)(\mu + \Delta) \right].\end{aligned}$$

Ясно, что

$$0 < z_1 < 1, 0 < z_2 < 1,$$



поэтому получим

$$\begin{aligned} |\rho_1 + \rho_2| &\leq h_1(k) z_1^{m_k}, \\ \rho_1 \rho_2 &\leq h_2(k) z_2^{m_k}, \end{aligned}$$

где  $h_1(k), h_2(k)$  ограничены при  $k \rightarrow \infty$ .

Предположим, что неравенство

$$(\text{Tr} Z_k)^2 - 4 \det Z_k < 0 \tag{1.34}$$

выполнено для бесконечного числа номеров  $k$ , это значит, что соответствующие собственные числа являются комплексно сопряженными, т.е.

$$|\rho_1| = |\rho_2| = (\det Z_k)^{0.5} \leq (h_2(k) z_2^{m_k})^{0.5}.$$

Известно, что характеристические показатели периодических точек  $(x_{k0}, y_{k0})$  определяются как

$$\nu_i = (m_k + n)^{-1} \ln |\rho_i|, i = 1, 2.$$

Если неравенства (1.34) справедливы, то

$$\nu_i \leq (m_k + n)^{-1} [\ln h_2(k) + 0.5 m_k \ln z_2] \leq 0.25 \ln z_2 < 0, \tag{1.35}$$

где  $i = 1, 2$ , а номера  $k$  достаточно большие.

Если неравенство (1.34) не выполняется для всех  $k$  (начиная с некоторого номера), то соответствующие собственные числа будут действительными числами одного знака, поэтому

$$|\rho_i| \leq |\text{Tr} Z_k| \leq h_1(k) z_1^{m_k}, \text{ где } i=1, 2,$$

откуда, так же, как и в предыдущем случае, получим

$$\nu_i \leq 0.5 \ln z_1 < 0,$$

где  $i = 1, 2$ , а номера  $k$  достаточно велики.

Последние неравенства и неравенства (1.35) доказывают теорему 1.2.

### 1.3 СПОСОБЫ ПОСТРОЕНИЯ ФУНКЦИЙ, УДОВЛЕТВОРЯЮЩИХ УСЛОВИЯМ ТЕОРЕМ 1.1, 1.2

Основная задача данного раздела – описать способ построения функций, удовлетворяющих условиям (1.19), (1.20), которые определяют характер касания устойчивого и неустойчивого многообразий, кроме того, в этом разделе приведен способ построения функций, удовлетворяющих условиям (1.23), (1.24).

Пусть, как и раньше,  $f$  – исходный диффеоморфизм, предполагаем, что в некоторой окрестности начала координат  $V$  он задается формулами

$$f \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \lambda x + p(x, y) \\ \mu y + q(x, y) \end{pmatrix},$$

где  $\lambda, \mu$  положительные действительные числа такие, что  $\lambda < 1 < \mu$ ,  $\lambda\mu < 1$ , функции  $p, q$  являются непрерывно дифференцируемыми в окрестности нуля и равны нулю вместе со своими производными в начале координат, а именно

$$\begin{aligned} p(0,0) &= q(0,0) = 0, \\ \frac{\partial p(0,0)}{\partial x} &= \frac{\partial p(0,0)}{\partial y} = 0, \\ \frac{\partial q(0,0)}{\partial x} &= \frac{\partial q(0,0)}{\partial y} = 0. \end{aligned}$$

Предполагается, что в исходной окрестности начала координат

$$p(0, y) = q(x, 0) = 0.$$

Пусть постоянная  $R > 0$  такова, что

$$V_1 = \{(x, y) : |x| < R, |y| < R\} \subset V.$$

Допустим, что существует нетрансверсальная гомоклиническая точка  $w$ , лежащая в  $V$ , т.е.  $w \neq 0$  и  $w \in W^u(0) \cap W^s(0)$ .

Пусть  $(x^0, 0), (0, y^0)$  – точки из орбиты указанной нетрансверсальной гомоклинической точки, принадлежащие окрестности нуля  $V_1$ .  
Предполагаем, что

$$x^0 > 0, y^0 > 0.$$

Пусть  $L$  – отображение выпуклой окрестности  $U \subset V_1$  точки  $(0, y^0)$  на некоторую окрестность точки  $(x^0, 0)$ , которое является сужением степени исходного диффеоморфизма на эту окрестность, в координатах  $L$  записывается так

$$L \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x^0 + ax + b(y - y^0) + \varphi(x, y - y^0) \\ cx + g(y - y^0) + \psi(x) \end{pmatrix},$$

где  $a, b, c$  – действительные числа, такие что  $b < 0, c > 0$ .

Считаем, что

$$L(U) \subset V_1.$$

Функции  $\varphi, g, \psi$  – непрерывно дифференцируемые функции одной или двух переменных в окрестности нуля, которые равны нулю вместе со своими производными в нуле. Предполагается, что производные функций  $\psi, \varphi$  ограничены постоянной  $M$  в окрестности нуля.

Ясно, что характер касания устойчивого и неустойчивого многообразий в точке  $(x^0, 0)$  определяется свойствами функции  $g$ .

Для построения функции  $g(t)$ , удовлетворяющей условиям (1.19), (1.20), надо определить положительные стремящиеся к нулю последовательности  $\sigma_k, \varepsilon_k$ , причем последовательность  $\sigma_k$  должна быть убывающей. Кроме того, элементы этих последовательностей должны удовлетворять условиям (1.7), точнее

$$\sigma_k - \varepsilon_k > \sigma_{k+1} + \varepsilon_{k+1}.$$

Пусть, как и ранее,

$$\begin{aligned} x_k &= (x^0 + b\sigma_k)(1 - \lambda^{m_k} a)^{-1}, \\ y_k &= (y^0 + \sigma_k)\mu^{-m_k}, \\ d &= \min[0.25, 0.25(|b| + M)], \end{aligned}$$

а  $m_k$  – строго возрастающая последовательность натуральных чисел такая, что

$$(\lambda + \theta)^{m_k} (\mu + \theta)^{m_k} < \varepsilon_k,$$

где  $\theta$ , неотрицательная величина, удовлетворяющая условиям (1.17).

Задача этого раздела – построить непрерывно дифференцируемую функцию  $g$ , удовлетворяющую условиям (1.19), (1.20), точнее такую функцию, чтобы при любом  $k$  и  $t \in (\sigma_k - \varepsilon_k, \sigma_k + \varepsilon_k)$  выполнялись следующие неравенства

$$\begin{aligned} |g(\sigma_k) + c\lambda^{m_k} x_k - y_k| &< 0.25\varepsilon_k d (\mu + \theta)^{-m_k}, \\ |g'(t)| &< (\mu + \theta)^{-\alpha m_k}, \text{ где } \alpha > 1. \end{aligned}$$

Для построения функции  $g$  определим последовательности, удовлетворяющие всем вышеперечисленным условиям, для этого зафиксируем положительную  $\sigma$  такую что

$$\max[\lambda\mu, \mu^{-1}] < \sigma < 1. \tag{1.36}$$

По выбранному  $\sigma$  зафиксируем неотрицательную  $\theta$ , такую что

$$\begin{aligned} (\lambda + \theta)(\mu + \theta) &< \sigma < 1, \\ (1 + \theta\lambda^{-1})\sigma &< 1. \end{aligned} \tag{1.37}$$

Отметим, что если исходный диффеоморфизм линеен в окрестности нуля, то в этом случае полагаем  $\theta = 0$ . Этот случай рассмотрен в разделе 1.

Определим последовательности из условий  $\sigma_k, \varepsilon_k, m_k$  как

$$\begin{aligned}\sigma_k &= \sigma^k, \\ \varepsilon_k &= 2(\lambda + \theta)^k (\mu + \theta)^k, \\ m_k &= k.\end{aligned}\tag{1.38}$$

Условия (1.18) выполнены, проверим условия (1.7). Из (1.37), (1.38) следует, что

$$\lim_{k \rightarrow \infty} (1 - \sigma - \varepsilon_k \sigma^{-k} - \varepsilon_{k+1} \sigma^{-k}) = 1 - \sigma > 0.$$

Таким образом, для достаточно больших номеров  $k$  имеет место (1.7) или

$$(\sigma^k - \varepsilon_k, \sigma^k + \varepsilon_k) \cap (\sigma^{k+1} - \varepsilon_{k+1}, \sigma^{k+1} + \varepsilon_{k+1}) = \emptyset.$$

Пусть

$$\gamma_k = y_k - c\lambda^k x_k,$$

где  $x_k, y_k$  определены ранее. Ясно, что

$$\begin{aligned}\lim_{k \rightarrow \infty} \mu^k \gamma_k &= y^0 > 0, \\ \lim_{k \rightarrow \infty} \mu^k (\gamma_k - \gamma_{k+1}) &= y^0 (1 - \mu^{-1}) > 0,\end{aligned}$$

откуда

$$\gamma_k - \gamma_{k+1} > 0.$$

Из определения  $\gamma_k$  имеем

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \gamma_k \sigma^{-k} = 0.$$

Пусть

$$u_k = \sigma^k - \varepsilon_k, v_k = \sigma^k + \varepsilon_k.$$

На каждом промежутке  $[v_{k+1}, u_k]$  рассмотрим произвольную непрерывную неотрицательную функцию  $h_k(t)$ , не равную тождественно нулю.

Пусть, кроме того,

$$\begin{aligned} h_k(v_{k+1}) = h_k(u_k) = 0, \\ \max_{t \in [v_{k+1}, u_k]} h_k(t) \leq H, \end{aligned} \tag{1.39}$$

т.е.  $h_k(t)$  обращаются в нуль на концах промежутка задания и их значения ограничены величиной  $H$ , не зависящей от  $k$ .

Обозначим через

$$I_k = \int_{v_{k+1}}^{u_k} h_k(t) dt,$$

предположим, что существует положительная величина  $h$ , не зависящая от  $k$  такая, что

$$I_k \geq h(u_k - v_{k+1}) > 0. \tag{1.40}$$

**Теорема 1.3.** Пусть выполнены условия (1.36)-(1.40), тогда функция

$$g(t) = \begin{cases} (\gamma_k - \gamma_{k+1})(I_k)^{-1} \int_{v_{k+1}}^t h_k(s) ds + \gamma_{k+1}, t \in [v_{k+1}, u_k] \\ \gamma_k, t \in [u_k, v_k] \\ 0, t = 0 \end{cases} \tag{1.41}$$

является непрерывно дифференцируемой функцией на  $[0, \sigma^{\bar{k}})$ , где  $\bar{k}$  достаточно большое натуральное число.

**Доказательство.** Считаем, что натуральное число  $\bar{k}$  настолько велико, что при  $k \geq \bar{k}$  функция  $g$ , определенная в (1.41) является положительной неубывающей функцией класса  $C^1$  на  $(0, \sigma^{\bar{k}})$ , более того, очевидно, что  $\lim_{t \rightarrow +0} g(t) = 0$ . Таким образом, функция  $g$  непрерывна на  $[0, \sigma^{\bar{k}})$ .

Функция  $g$  является непрерывно дифференцируемой функцией на  $(0, \sigma^{\bar{k}})$ , причем ее производная имеет вид

$$g'(t) = \begin{cases} (\gamma_k - \gamma_{k+1})(I_k)^{-1} h_k(t), t \in [v_{k+1}, u_k] \\ 0, t \in [u_k, v_k] \end{cases}.$$

Покажем, что  $g$  дифференцируема в нуле. Для этого рассмотрим произвольную положительную последовательность  $w_j$ , стремящуюся к нулю, и оценим отношение  $\frac{|g(w_j)|}{w_j}$ .

Для любого  $j$  найдется номер  $k_j$  такой, что

$$w_j \in [v_{k_j+1}, v_{k_j}],$$

при этом последовательность номеров  $k_j$  стремится к бесконечности с ростом  $j$ .

Рассмотрим неравенство

$$0 < \frac{|g(w_j)|}{w_j} \leq \frac{\gamma_{k_j}}{v_{k_j+1}},$$

с учетом определения  $v_k$  имеем

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \frac{\gamma_k}{v_{k+1}} = 0,$$

откуда

$$\lim_{j \rightarrow \infty} \frac{g(w_j)}{w_j} = 0.$$

Последовательность  $w_j$  была выбрана произвольно, следовательно,

$$\lim_{t \rightarrow +0} \frac{g(t)}{t} = 0.$$

Последнее равенство показывает, что функция  $g$  имеет в нуле правостороннюю производную равную нулю.

Покажем, что производная функции  $g$  непрерывна в нуле. Аналогично, фиксируем положительную последовательность  $w_j$ ,

стремящуюся к нулю. Для любого  $j$  найдется натуральное число  $k_j$  такое, что

$$w_j \in [v_{k_j+1}, v_{k_j}].$$

В силу (1.40) получим

$$0 < g'(w_j) \leq (\gamma_{k_j} - \gamma_{k_j+1}) I_{k_j}^{-1} H \leq (\gamma_{k_j} - \gamma_{k_j+1}) (u_{k_j} - v_{k_j+1})^{-1} h^{-1} H,$$

учитывая (1.36), имеем

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \frac{\gamma_k - \gamma_{k+1}}{u_k - v_{k+1}} = 0,$$

откуда

$$\lim_{j \rightarrow +\infty} g'(w_j) = 0.$$

Окончательно, в силу произвольного выбора последовательности  $w_j$  функция  $g$ , определенная на  $[0, \sigma^{\bar{k}})$ , является непрерывно дифференцируемой на этом промежутке.

Теорема 1.3 доказана.

Ясно, что функцию  $g$ , определенную формулами (1.41) можно доопределить с сохранением гладкости на  $(-\sigma^{\bar{k}}, \sigma^{\bar{k}})$ , построенная таким образом функция удовлетворяет условиям (1.19), (1.20).

В результате, если сужение степени исходного диффеоморфизма  $f$  в окрестности  $U$  имеет вид (1.5), а функция  $g$  в окрестности начала координат задана формулами (1.41), то эта функция удовлетворяет условиям теорем 1.1, 1.2 этой главы.

В качестве примера, на каждом промежутке  $[v_{k+1}, u_k]$  рассмотрим функцию

$$h_k(t) = \begin{cases} 2r_k^{-1}t - 2v_{k+1}r_k^{-1}, & t \in [v_{k+1}, s_k] \\ -2r_k^{-1}t + 2u_k r_k^{-1}, & t \in [s_k, u_k] \end{cases},$$



где

$$\begin{aligned} s_k &= 0.5(u_k + v_{k+1}), \\ r_k &= u_k - v_{k+1}, \end{aligned}$$

т.е.  $s_k$  – середина отрезка  $[v_{k+1}, u_k]$ , а  $r_k$  – его длина, в этом случае условия (1.39), (1.40) выполнены, причем  $H = 1, h = 0.5$ .

Предположим, что диффеоморфизм  $f$  не является линейным в окрестности начала координат  $V$ . Считаем, что функция  $g$ , определенная в (1.5), удовлетворяет условиям теоремы 1.3, таким образом, определен характер касания устойчивого и неустойчивого многообразий в соответствующей точке. В этих условиях построим функции  $p, q$ , которые не являются тождественно равными нулю, и удовлетворяют условиям (1.23), (1.24) в окрестности  $V_1 \subset V$ .

Заметим, что функции  $p, q$  равны нулю вместе со своими производными в нуле, кроме того,

$$p(0, y) = q(x, 0) = 0,$$

т.е. в окрестности нуля устойчивое многообразие  $W_{loc}^s$  совпадает с осью  $(0, x)$ , а неустойчивое многообразие – с осью  $(0, y)$ .

По определенным ранее положительным величинам  $\sigma, \theta$  выберем еще две положительные величины

$$\begin{aligned} 0 &< \Delta < 0.5\theta, \\ \beta &> -\frac{\ln(\lambda + \theta)}{\ln(\mu + \theta)} > 1. \end{aligned}$$

По последовательностям  $\sigma_k, \varepsilon_k, m_k$ , заданным формулами (1.38), определим конечную последовательность множеств

$$\begin{aligned} B_k^j &= \left\{ (x, y) : |x - \lambda^j x_k| < (\lambda + \theta)^j \sigma^k, |y - \mu^j y_k| < d \varepsilon_k (\mu + \theta)^{-k+j} \right\}, \\ j &= 0, 1, \dots, k. \end{aligned}$$

Ясно, что если величина  $k$  велика, то имеют место следующие включения

$$B_k^0 \subset L(U), B_k^j \subset V_1, j = 0, 1, \dots, k.$$

В дальнейшем предполагается, что последние включения выполняются для всех  $k > 1$ .

Условия (1.23), (1.24) имеют вид

$$\begin{aligned} |p(\lambda^j x_k, \mu^j y_k)| &< 0.5(\lambda + \theta)^j \sigma^k, \\ |q(\lambda^j x_k, \mu^j y_k)| &< 0.5d\varepsilon_k (\mu + \theta)^{-k+j}, \\ \left| \frac{\partial p(x, y)}{\partial x} \right| &< \Delta, \\ \left| \frac{\partial p(x, y)}{\partial y} \right| &< (\mu + \theta)^{-\beta k}, \\ \left| \frac{\partial q(x, y)}{\partial x} \right| &< (\mu + \theta)^{-\beta k}, \\ \left| \frac{\partial q(x, y)}{\partial y} \right| &< \Delta, \end{aligned} \tag{1.42}$$

$$(x, y) \in B_k^j, j = 0, 1, \dots, k-1.$$

Вышеперечисленные свойства функций  $p, q$  означают, что характер касания устойчивого и неустойчивого многообразий в точках  $f^j \begin{pmatrix} x^0 \\ 0 \end{pmatrix}, j \geq 0$  должен быть аналогичен характеру касания этих многообразий в точке  $(x^0, 0)$ .

Для построения функций, удовлетворяющих условиям (1.42), введем следующие обозначения. Пусть

$$\eta = -\frac{\ln \lambda}{\ln \mu} > 1,$$

последнее неравенство имеет место в силу условия (1.2).

Определим

$$\begin{aligned} t_k &= x_k y_k^\eta, \\ r_k &= \left( x_k - (1 + \theta \lambda^{-1})^k \sigma^k \right) (y_k - d \varepsilon_k \mu^{-k})^\eta, \\ s_k &= \left( x_k + (1 + \theta \lambda^{-1})^k \sigma^k \right) (y_k + d \varepsilon_k \mu^{-k})^\eta, \end{aligned}$$

где последовательности  $x_k, y_k$  введены ранее.

Из условий (1.37), (1.38) следуют соотношения

$$\begin{aligned} 0 &< r_k < t_k < s_k, k = 1, 2, \dots, \\ \lim_{k \rightarrow \infty} r_k &= \lim_{k \rightarrow \infty} t_k = \lim_{k \rightarrow \infty} s_k = 0, \\ \lim_{k \rightarrow \infty} \mu^{k\eta} t_k &= \lim_{k \rightarrow \infty} \mu^{k\eta} r_k = \lim_{k \rightarrow \infty} \mu^{k\eta} s_k = (x^0)(y^0)^\eta, \\ \lim_{k \rightarrow \infty} \mu^{k\eta} (r_k - s_{k+1}) &= (x^0)(y^0)^\eta (1 - \mu^{-1}) > 0. \end{aligned}$$

Из последних соотношений имеем

$$(r_k - s_{k+1}) > 0, \quad (1.43)$$

при достаточно больших  $k$ . В дальнейшем считаем, что эти неравенства справедливы для любых  $k$ .

Пусть  $F(t)$  – произвольная непрерывно дифференцируемая функция, определенная в окрестности нуля, причем  $F(0) = F'(0) = 0$ . Кроме того, пусть для любого  $k$  имеют место неравенства

$$\begin{aligned} |F(t_k)| &< 0.5\theta(\lambda + \theta)^k \sigma^k, \\ |F'(t)| &< (\eta R^\eta)^{-1} (\mu + \theta)^{-\beta k}, t \in [r_k, s_k]. \end{aligned} \quad (1.44)$$

**Теорема 1.4.** Пусть  $F(t)$  удовлетворяет условиям (1.44), тогда функции  $p, q$ , определенные как

$$\begin{aligned} p(x, y) &= F(xy^\eta), \\ q(x, y) &= F(xy^\eta) \end{aligned} \quad (1.45)$$

являются непрерывно дифференцируемыми в окрестности нуля и удовлетворяют условиям (1.42).

**Доказательство.** Проверим выполнение условий (1.42), с учетом определения величины  $\eta$ , имеем

$$\begin{aligned} p(\lambda^j x_k, \mu^j y_k) &= F(\lambda^j \mu^{jn} x_k y_k^n) = F(t_k), \\ q(\lambda^j x_k, \mu^j y_k) &= F(t_k). \end{aligned}$$

Зафиксируем произвольные  $j, k$  такие, что  $0 \leq j \leq k$ , и рассмотрим  $(x, y) \in B_k^j$ . Ясно, что

$$\begin{aligned} x &= \lambda^j x_k + z_1, \\ y &= \mu^j y_k + z_2, \end{aligned}$$

где

$$\begin{aligned} |z_1| &< (\lambda + \theta)^j \sigma^k, \\ |z_2| &< d\varepsilon_k (\mu + \theta)^{-k+j} = 2d(\lambda + \theta)^k (\mu + \theta)^j. \end{aligned}$$

Вычислим

$$xy^n = (\lambda^j x_k + z_1)(\mu^j y_k + z_2)^n = (x_k + \lambda^{-j} z_1)(y_k + \mu^{-j} z_2)^n,$$

где

$$\begin{aligned} |\lambda^{-j} z_1| &< \lambda^{-j} (\lambda + \theta)^j \sigma^k \leq (1 + \theta \lambda^{-1})^k \sigma^k, \\ |\mu^{-j} z_2| &< 2d\mu^{-j} (\mu + \theta)^j (\lambda + \theta)^k \leq 2d\mu^{-k} (\mu + \theta)^k (\lambda + \theta)^k = d\varepsilon_k \mu^{-k}. \end{aligned}$$

В результате получим

$$r_k \leq xy^n \leq s_k$$

если  $(x, y) \in B_k^j$ .

Продифференцируем функции  $p, q$

$$\begin{aligned} \frac{\partial p(x, y)}{\partial x} &= y^n F'(xy^n), \\ \frac{\partial p(x, y)}{\partial y} &= \eta xy^{n-1} F'(xy^n), \end{aligned}$$

для функции  $q$  имеем аналогичные производные. Оценим эти величины с учетом (1.45)

$$\left| \frac{\partial p(x, y)}{\partial x} \right| \leq R^n |F'(xy^n)| < (\mu + \theta)^{-\beta k},$$

$$\left| \frac{\partial p(x, y)}{\partial y} \right| \leq \eta R^n |F'(xy^n)| < (\mu + \theta)^{-\beta k}.$$

Аналогично

$$\left| \frac{\partial q(x, y)}{\partial x} \right| < (\mu + \theta)^{-\beta k},$$

$$\left| \frac{\partial q(x, y)}{\partial y} \right| < (\mu + \theta)^{-\beta k}.$$

Последние неравенства выполняются при  $(x, y) \in B_k^j, 0 \leq j \leq k$ . В результате получено, что если функции  $p, q$  определяются формулами (1.45), то они удовлетворяют условиям (1.42) при достаточно больших номерах  $k$ .

Теорема 1.4 доказана.

Таким образом, если исходный диффеоморфизм  $f$  в окрестности нуля  $V_1$  задается формулами (1.15), причем функции  $p, q, g$ , определенные в (1.5), (1.15), удовлетворяют условиям теорем 1.3, 1.4, тогда, как следует из теоремы 1.2,  $f$  имеет счетное множество устойчивых периодических точек, характеристические показатели которых отделены от нуля.

В конце раздела построим пример функции  $F(t)$ , удовлетворяющей условиям (1.44).

Из условий (1.43) следует, что промежутки  $[s_{k+1}, r_k]$  не пересекаются. На каждом таком промежутке рассмотрим произвольную непрерывную функцию  $F_k(t)$ , удовлетворяющую следующим свойствам:

$$\begin{aligned} F_k(s_{k+1}) = F_k(r_k) = 0, \\ \int_{s_{k+1}}^{r_k} F_k(t) dt = 0. \end{aligned} \quad (1.46)$$

Пусть  $A_k = \max_{t \in [s_{k+1}, r_k]} |F_k(t)| \geq 0$ ,

предположим, что

$$\lim_{k \rightarrow \infty} A_k = 0. \quad (1.47)$$

Имеет место следующая теорема

**Теорема 1.5.** Пусть выполнены условия (1.46), (1.47), а функция  $F(t)$  определена на интервале  $[0, s_1]$  следующим образом

$$F(t) = \begin{cases} \int_{s_{k+1}}^t F_k(\tau) d\tau, t \in [s_{k+1}, r_k] \\ 0, t \in [r_k, s_k] \\ 0, t = 0 \end{cases}, \quad (1.48)$$

тогда  $F(t)$  является непрерывно дифференцируемой функцией на  $[0, s_1]$ , и ее производная равна

$$F'(t) = \begin{cases} F_k(t), t \in [s_{k+1}, r_k] \\ 0, t \in [r_k, s_k] \\ 0, t = 0 \end{cases}.$$

**Доказательство.** Ясно, что

$$\max_{t \in [s_{k+1}, s_k]} |F(t)| \leq A_k (r_k - s_{k+1}).$$

Из определения функции  $F$  следует, что она непрерывно дифференцируема на  $(0, s_1]$ , причем  $\lim_{t \rightarrow +0} F(t) = \lim_{t \rightarrow +0} F'(t) = 0$ , из этих соотношений следует непрерывность  $F$  в нуле.

Покажем, что  $F$  имеет непрерывную правостороннюю производную в нуле, равную нулю. Пусть  $w_j$  – произвольная положительная, стремящаяся к нулю последовательность. Ясно, что для любого номера  $k$  найдется натуральное число  $k_j$  такое, что  $w_j \in [s_{k_j+1}, s_{k_j})$ , причем  $\lim_{j \rightarrow \infty} k_j = +\infty$ .

Оценим отношение

$$\left| \frac{F(w_j)}{w_j} \right| \leq \frac{A_{k_j}(r_{k_j} - s_{k_j+1})}{s_{k_j+1}}.$$

С учетом условий (1.43), (1.47), имеем

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \frac{A_k(r_k - s_{k+1})}{s_{k+1}} = 0,$$

откуда

$$\lim_{j \rightarrow \infty} \frac{F(w_j)}{w_j} = 0.$$

Последовательность  $w_j$  выбрана произвольно, поэтому

$$\lim_{t \rightarrow +0} \frac{F(t)}{t} = 0.$$

Окончательно, если функция  $F(t)$ , определена на промежутке  $[0, s_1]$  формулами (1.48), то она имеет в нуле непрерывную производную.

Теорема 1.5 доказана.

Пусть  $A_k$  – произвольная последовательность, удовлетворяющая условиям

$$A_k > 0,$$

$$\lim_{k \rightarrow \infty} A_k = 0,$$

тогда функцию  $F_k(t)$  определим на  $[s_{k+1}, r_k]$  следующим образом

$$F_k(t) = \begin{cases} 4A_k (r_k - s_{k+1})^{-1} (t - s_k), t \in [s_{k+1}, 0.25(3s_{k+1} + r_k)], \\ 4A_k (s_{k+1} - r_k)^{-1} (t - 0.5(s_{k+1} + r_k)), t \in [0.25(3s_{k+1} + r_k), 0.25(s_{k+1} + 3r_k)], \\ 4A_k (r_k - s_{k+1})^{-1} (t - r_k), t \in [0.25(s_{k+1} + 3r_k), r_k]. \end{cases}$$

Очевидно, что в этом случае условия (1.46), (1.47) выполнены.

Ясно, что функцию  $F$ , определенную в (1.48), можно доопределить произвольным образом на промежутке  $[-s_1, s_1]$  с сохранением гладкости, получим функцию, удовлетворяющую условиям (1.44).

Таким образом, если функции  $p$ ,  $q$ ,  $g$  удовлетворяют условиям теорем 1.3, 1.4, то диффеоморфизм  $f$  имеет счетное множество устойчивых периодических точек с отделенными от нуля характеристическими показателями.



## ГЛАВА 2 ГЛАДКИЕ ДИФФЕОМОРФИЗМЫ ПЛОСКОСТИ

### 2.1 ДИФФЕОМОРФИЗМЫ ПЛОСКОСТИ КОНЕЧНОГО КЛАССА ГЛАДКОСТИ

Пусть, как и ранее,  $f$  – диффеоморфизм плоскости в себя с неподвижной седловой точкой в начале координат, т.е.  $f(0) = 0$ ; предположим, что  $f$  класса  $C^r$ , где  $1 < r < \infty$ . Заметим, что случай  $r = 1$  подробно описан в главе 1, а случай  $r = \infty$  рассматривается ниже.

Считаем, что в некоторой выпуклой окрестности  $V$  точки  $0$  диффеоморфизм имеет следующий вид

$$f \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \lambda x + p(x, y) \\ \mu y + q(x, y) \end{pmatrix}, \quad (2.1)$$

где функции  $p, q$  того же класса гладкости, что и  $f$ , причем

$$\begin{aligned} p(0,0) &= q(0,0) = 0, \\ \frac{\partial p(0,0)}{\partial x} &= \frac{\partial p(0,0)}{\partial y} = 0, \\ \frac{\partial q(0,0)}{\partial x} &= \frac{\partial q(0,0)}{\partial y} = 0. \end{aligned}$$

Предполагаем, что

$$0 < \lambda < 1 < \mu, \quad \lambda\mu < 1. \quad (2.2)$$

Пусть в  $V$  выполняются следующие условия

$$p(0, y) = q(x, 0) = 0. \quad (2.3)$$

Фиксируем положительную величину  $\theta$ , такую что

$$\begin{aligned} 0 < \lambda - \theta < \lambda + \theta < 1 < \mu - \theta, \\ (\lambda + \theta)(\mu + \theta) < 1. \end{aligned}$$

Предполагается наличие нетрансверсальной гомоклинической точки. Пусть точка  $(0, y^0)$ , где  $y^0 \neq 0$ , принадлежит  $V$  и является гомоклинической, т.е.

$$(0, y^0) \in W^s(0) \cap W^u(0).$$

Из определения гомоклинической точки следует, что существует точка  $(x^0, 0)$  лежащая в  $V$ , такая, что при некотором  $n > 0$  имеет место равенство

$$f^n \begin{pmatrix} 0 \\ y^0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x^0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Считаем, что

$$x^0 > 0, y^0 > 0. \tag{2.4}$$

Пусть

$$V_1 = \{(x, y) : |x| < \lambda^{-1}x^0, |y| < \mu y^0\} \subset V,$$

а  $U$  – выпуклая окрестность точки  $(0, y^0)$  такая, что  $U \subset V_1$ .

Рассмотрим сужение  $f^n$  на  $U$ , обозначим его через  $L$ , в координатах получим

$$f^n|_U \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = L \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x^0 + ax + b(y - y^0) + \varphi(x, y - y^0) \\ cx + g(y - y^0) + \psi(x) \end{pmatrix},$$

где  $a, b, c$  – действительные числа такие, что

$$b < 0, c > 0, \tag{2.5}$$

а функции  $g, \varphi, \psi$  определены в окрестности начала координат, имеют тот же класс гладкости, что и исходный диффеоморфизм  $f$ , и обращаются в нуль вместе со своими первыми производными в начале координат, т.е.

$$\begin{aligned}\varphi(0,0) &= \psi(0) = g(0) = 0, \\ \frac{\partial \varphi(0,0)}{\partial x} &= \frac{\partial \varphi(0,0)}{\partial y} = 0, \\ \psi'(0) &= 0, \\ g'(0) &= 0.\end{aligned}$$

Пусть производные первого порядка функций  $\psi$  и  $\varphi$  ограничены в окрестности  $U$  постоянной  $M > 0$ , а  $d$  – следующая постоянная

$$d = \min \left[ 0.25, 0.25(|b| + M)^{-1} \right].$$

Касание устойчивого и неустойчивого многообразий в точке  $(x^0, 0)$  определяется свойствами функции  $g$ , как и в главе 1 характер касания описывается с помощью последовательностей. Пусть  $\sigma_k, \varepsilon_k$  – положительные, стремящиеся к нулю, последовательности действительных чисел, причем последовательность  $\sigma_k$  убывает. Пусть для любого  $k$

$$\sigma_k - \varepsilon_k > \sigma_{k+1} + \varepsilon_{k+1}. \quad (2.6)$$

Пусть  $m_k$  – строго возрастающая последовательность натуральных чисел такая, что

$$(\lambda + \theta)^{m_k} (\mu + \theta)^{m_k} < \varepsilon_k. \quad (2.7)$$

Обозначим через

$$\begin{aligned}x_k &= (x^0 + b\sigma_k)(1 - \lambda^{m_k} a)^{-1}, \\ y_k &= (y^0 + \sigma_k)\mu^{-m_k}.\end{aligned}$$

Предположим, что функция  $g$  является функцией класса  $C^r$  ( $1 < r < \infty$ ) в окрестности начала координат, причем  $g(0) = 0$ .

Кроме того, пусть для любых  $k$  справедливы неравенства

$$|g(\sigma_k) + c\lambda^{m_k} x_k - y_k| < d\varepsilon_k (\mu + \theta)^{-m_k}. \quad (2.8)$$

Предположим, что существует  $\alpha > 1$ , не зависящая от  $k$ , такая, что при любых  $k$

$$|g'(t)| < (\mu + \theta)^{-\alpha m_k}, \quad t \in (\sigma_k - \varepsilon_k, \sigma_k + \varepsilon_k). \quad (2.9)$$

Таким образом, основные условия, которые накладываются на  $C^r$ -гладкую функцию  $g$ , совпадают с условиями, сформулированными в главе 1 в разделах 1.1 и 1.2. Основная задача этой главы – убедиться, что можно построить функцию  $g$  с вышеуказанными свойствами.

Для выполнения условий (2.8), (2.9) последовательность  $m_k$  должна стремиться к бесконечности достаточно быстро.

Для любого фиксированного  $k$  определим конечную последовательность множеств

$$B_k^j = \left\{ (x, y) : |x - \lambda^j x_k| < (\lambda + \theta)^j \sigma_k, |y - \mu^j y_k| < d\varepsilon_k (\mu + \theta)^{j-m_k} \right\},$$

где  $j = 0, 1, \dots, m_k$ .

Считаем, что  $B_k^j \subset V_1$ .

Фиксируем положительную постоянную  $\beta$  такую, что

$$\beta > -\frac{\ln(\lambda + \theta)}{\ln(\mu + \theta)} > 1.$$

Пусть функции  $p, q$  удовлетворяют следующим условиям

$$\begin{aligned}
 |p(\lambda^j x_k, \mu^j y_k)| &< 0.5\theta(\lambda + \theta)^j \sigma_k, \\
 |q(\lambda^j x_k, \mu^j y_k)| &< 0.5\theta d\varepsilon_k (\mu + \theta)^{j-m_k}, \\
 \left| \frac{\partial p(x, y)}{\partial x} \right| &< 0.25\theta, \\
 \left| \frac{\partial p(x, y)}{\partial y} \right| &< (\mu + \theta)^{-\beta m_k}, \\
 \left| \frac{\partial q(x, y)}{\partial x} \right| &< (\mu + \theta)^{-\beta m_k}, \\
 \left| \frac{\partial q(x, y)}{\partial y} \right| &< 0.25\theta,
 \end{aligned} \tag{2.10}$$

$$(x, y) \in B_k^j, j = 0, 1, \dots, m_k - 1.$$

Условия (2.10) означают, что характер касания устойчивого и неустойчивого многообразий в точках  $f^j \begin{pmatrix} x^0 \\ 0 \end{pmatrix}$ , где  $j > 0$ , аналогичен характеру касания этих многообразий в точке  $(x^0, 0)$ .

Имеет место следующая теорема.

**Теорема 2.1.** Пусть выполнены условия (2.1)-(2.10), тогда диффеоморфизм  $f$  имеет счетное множество устойчивых периодических точек с отделенными от нуля характеристическими показателями.

Доказательство теоремы 2.1 аналогично доказательству теоремы 1.2 главы 1.

Основная задача этой главы – показать способ построения  $C^r$ -гладкой функции  $g$ , которая удовлетворяет условиям (2.8), (2.9) и, тем самым, определяет характер касания устойчивого и неустойчивого многообразий в точке  $(x^0, 0)$ , а также, указать на некоторые свойства этой функции, которые появляются с увеличением класса гладкости.

**Теорема 2.2.** Пусть  $g$  произвольная  $C^r$ -гладкая функция, определенная в окрестности нуля, пусть выполнены условия (2.8), (2.9), тогда

$$g(0) = g'(0) = \dots = g^{(r)}(0) = 0. \quad (2.11)$$

**Доказательство.** Пусть  $r > 1$ , при  $r = 1$  утверждение теоремы следует из условий (2.8), (2.9).

Равенства  $g(0) = g'(0) = 0$  очевидны, поэтому, рассмотрим производные более высоких порядков. Применив теорему Лагранжа к промежутку  $[\sigma_{k+1}, \sigma_k]$ , получим

$$g(\sigma_k) - g(\sigma_{k+1}) = g'(\tau_k)(\sigma_k - \sigma_{k+1}),$$

где  $\tau_k \in (\sigma_{k+1}, \sigma_k)$ . Таким образом,

$$\max_{t \in [\sigma_{k+1}, \sigma_k]} g'(t) \geq \frac{g(\sigma_k) - g(\sigma_{k+1})}{\sigma_k - \sigma_{k+1}}.$$

Определим

$$A_k = \mu^{m_k} g(\sigma_k),$$

ясно, что

$$\lim_{k \rightarrow \infty} A_k = y^0 > 0.$$

В результате получим, с учетом определения последовательности  $m_k$ ,

$$\max_{t \in [\sigma_{k+1}, \sigma_k]} g'(t) \geq \mu^{-m_k} (A_k - \mu^{-(m_{k+1} - m_k)} A_{k+1}) (\sigma_k - \sigma_{k+1})^{-1} > \mu^{-\alpha m_k} \geq (\mu + \theta)^{-\alpha m_k}$$

Функция  $g$  является  $r$  раз непрерывно дифференцируемой следовательно, ее производная достигает своего максимального значения на промежутке  $[\sigma_{k+1}, \sigma_k]$ . Из последних неравенств и условий (2.9) следует, что это максимальное значение достигается в точке  $\delta_k$ , которая лежит внутри промежутка, т.е.  $\delta_k \in (\sigma_{k+1}, \sigma_k)$ . При  $r > 1$  производная функции  $g$  является непрерывно дифференцируемой функцией, следовательно, по теореме Ролля  $g''(\delta_k) = 0$ . Последовательность  $\delta_k$  является убывающей положительной последовательностью, стремящейся к нулю с ростом  $k$ . В результате имеем

$$g''(0) = 0.$$

При  $r > 2$  все производные функции  $g$  до порядка  $r$  включительно обращаются в нуль бесконечное число раз в любой окрестности начала координат, потому что между двумя нулями дифференцируемой функции лежит хотя бы один нуль ее производной. Следовательно,

$$g^{(i)}(0) = 0, i = 0, 1, \dots, r.$$

Теорема 2.2 доказана.

Заметим, что в работах Ш.Ньюхауса [1], Н.К.Гаврилова, Л.П.Шильникова [21], [22] и некоторых других авторов рассматривался диффеоморфизм класса  $C^r$  ( $r > 1$ ) плоскости в себя с нетрансверсальной гомоклинической точкой, но характер касания устойчивого и неустойчивого многообразий в точке  $(x^0, 0)$  определялся следующими соотношениями

$$g(0) = g'(0) = \dots = g^{(r-1)}(0) = 0, g^{(r)}(0) \neq 0.$$

Из результатов этих работ следует, что при выполнении последних условий все однообходные периодические точки неустойчивы. Однако, в работе Б.Ф.Иванова [28] показано, что при выполнении некоторых

дополнительных условий, диффеоморфизм  $f$  имеет в расширенной окрестности гомоклинической точки счетное множество двухобходных устойчивых периодических точек, но, по крайней мере, один из характеристических показателей у таких точек стремится к нулю с ростом периода. Из теоремы 2.2 следует, что характер касания устойчивого и неустойчивого многообразий, представленный в диссертации, отличается от рассмотренных ранее случаев тем, что функция  $g$  не может иметь в нуле отличную от нуля производную какого-либо порядка.

По формуле Тейлора имеем  $g(\sigma_k) = o((\sigma_k)^r)$ , откуда

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \left( \mu^{m_k} (\sigma_k)^r \right)^{-1} = 0.$$

Опишем подробно способ построения функции  $g$ , удовлетворяющей условиям (2.8), (2.9).

Пусть  $\sigma_k, \varepsilon_k$  – произвольные положительные, стремящиеся к нулю последовательности, удовлетворяющие условиям (2.6).

Обозначим через

$$\begin{aligned} v_k &= \sigma_k - \varepsilon_k, \\ u_k &= \sigma_k + \varepsilon_k. \end{aligned}$$

Ясно, что эти последовательности стремятся к нулю и удовлетворяют неравенствам

$$u_k > v_k > u_{k+1} > v_{k+1} > 0.$$

Пусть  $h_k(t)$  – произвольная неотрицательная, не равная тождественно нулю, функция класса  $C^{r-1}$ , определенная на промежутке  $[u_{k+1}, v_k]$ , такая, что

$$\begin{aligned} h_k^{(i)}(u_{k+1}) &= h_k^{(i)}(v_k) = 0, \\ i &= 0, 1, \dots, r-1. \end{aligned} \tag{2.12}$$

Например, в качестве такой функции можно взять



$$h_k(t) = \left[ 0.25(v_k - u_{k+1})^2 - (t - 0.5(v_k + u_{k+1}))^2 \right]^r.$$

Пусть на всех промежутках  $[u_{k+1}, v_k]$  определены функции  $h_k(t)$  с вышеперечисленными свойствами.

Введем следующие положительные последовательности

$$\begin{aligned} I_k &= \int_{u_{k+1}}^{v_k} h_k(t) dt, \\ \bar{h}_{ki} &= \max_{t \in [u_{k+1}, v_k]} |h_k^{(i)}(t)|, \\ i &= 0, 1, \dots, r-1, \\ H_k &= \max_{0 \leq i \leq (r-1)} \bar{h}_{ki}. \end{aligned}$$

Ясно, что

$$0 < I_k \leq \bar{h}_{k0} (v_k - u_{k+1}).$$

Для дальнейших рассуждений потребуется следующая лемма.

**Лемма 2.1.** Пусть на каждом промежутке  $[u_{k+1}, v_k]$  задана произвольная неотрицательная не равная тождественно нулю функция, удовлетворяющая условиям (2.12), тогда для любых  $k$  справедливы неравенства

$$H_k \geq \frac{\bar{h}_{k0}}{(v_k - u_{k+1})^{r-1}}. \quad (2.13)$$

**Доказательство.** Заметим, что при  $r = 1$  утверждение леммы очевидно. Предположим, что  $r > 1$ , по индукции докажем, что

$$\begin{aligned} \bar{h}_{ki} &\geq \frac{\bar{h}_{ki-1}}{(v_k - u_{k+1})}, \\ i &= 1, 2, \dots, r-1. \end{aligned}$$

Обозначим точку максимума функции  $h_k(t)$  на промежутке  $[u_{k+1}, v_k]$  через  $\tau_{k0}$ , ясно, что эта точка лежит внутри промежутка. Применим теорему Лагранжа, в результате получим

$$h_k(\tau_{k0}) - h_k(u_{k+1}) = h'_k(\xi_{k0})(\tau_{k0} - u_{k+1}),$$

$$\xi_{k0} \in (u_{k+1}, \tau_{k0}] \subset (u_{k+1}, v_k).$$

Откуда

$$h'_k(\xi_{k0}) \geq \frac{h_k(\tau_{k0})}{(v_k - u_{k+1})},$$

но

$$h_k(\tau_{k0}) = \bar{h}_{k0},$$

$$|h'_k(\xi_{k0})| \leq \bar{h}_{k1},$$

следовательно,

$$\bar{h}_{k1} \geq \frac{\bar{h}_{k0}}{(v_k - u_{k+1})}.$$

Таким образом, база индукции доказана. Установим индукционный переход. Пусть нужное неравенство доказано до номера  $i < r-1$  включительно. Рассмотрим непрерывную функцию  $|h_k^{(i)}(t)|$ , она достигает своего максимального значения на промежутке  $[u_{k+1}, v_k]$  в некоторой внутренней точке промежутка  $\tau_{ki}$ . Применив теорему Лагранжа, получим

$$h_k^{(i)}(\tau_{ki}) = h_k^{(i+1)}(\xi_{ki})(\tau_{ki} - u_{k+1}),$$

$$\xi_{ki} \in (u_{k+1}, \tau_{ki}] \subset (u_{k+1}, v_k),$$

следовательно,

$$\bar{h}_{k(i+1)} \geq |h_k^{(i+1)}(\xi_{ki})| \geq \frac{\bar{h}_{ki}}{(v_k - u_{k+1})},$$

т.е. индукционный переход доказан. Из этих неравенств следуют неравенства (2.13).

Лемма 2.1 доказана.

Из свойств интеграла и условий (2.13) следует

$$H_k(I_k)^{-1} \geq (v_k - u_{k+1})^{-r},$$

откуда, как легко видеть, следует

$$\lim_{k \rightarrow \infty} H_k(I_k)^{-1} = +\infty.$$

Пусть

$$\zeta_k = (\ln(\mu + \theta))^{-1} \ln \left[ H_k(I_k u_{k+1})^{-1} \right],$$

ясно, что  $\lim_{k \rightarrow \infty} \zeta_k = +\infty$ .

Пусть  $l_k$  – возрастающая последовательность натуральных чисел такая, что

$$((\lambda + \theta)(\mu + \theta))^{l_k} < \varepsilon_k.$$

Определим

$$m_k = \max_{1 \leq i \leq k} [\zeta_i] + l_k,$$

где  $[\dots]$  – целая часть величины.

В результате, если числовые последовательности  $\sigma_k, \varepsilon_k, m_k$  обладают всеми вышеперечисленными свойствами, а на каждом промежутке  $[u_{k+1}, v_k]$  определена соответствующая функция  $h_k(t)$ , то справедливо следующее соотношение

$$\lim_{k \rightarrow \infty} (\mu)^{-m_k} H_k(I_k u_{k+1})^{-1} = 0. \quad (2.14)$$

Пусть

$$\gamma_k = \mu^{-m_k} (y^0 + \sigma_k) - c \lambda^{m_k} (x^0 + b \sigma_k) (1 - \lambda^{m_k} a)^{-1}.$$

Справедлива следующая теорема

**Теорема 2.3.** Пусть функция  $g$  определена на интервале  $[0, u_1)$  как

$$g(t) = \begin{cases} \gamma_k, t \in [v_k, u_k] \\ (\gamma_k - \gamma_{k+1})(I_k)^{-1} \int_{u_{k+1}}^t h_k(s) ds + \gamma_{k+1}, t \in [u_{k+1}, v_k], \\ 0, t = 0 \end{cases} \quad (2.15)$$

тогда эта функция является  $r$  раз непрерывно дифференцируемой.

**Доказательство.** Ясно, что  $g$  – класса  $C^r$  на  $(0, u_1)$ , докажем, что при  $t = 0$  функция  $g$  имеет  $r$  непрерывных производных, и все они равны нулю.

Пусть  $w_j$  – произвольная положительная последовательность, стремящаяся к нулю. Очевидно, что для любого  $j$  существует номер  $k_j$  такой, что

$$w_j \in [u_{k_j+1}, u_{k_j}),$$

$$\lim_{j \rightarrow \infty} k_j = +\infty,$$

если бы последнее условие не выполнялось, то последовательность  $k_j$  имела ограниченную подпоследовательность, а последовательность  $w_j$  имела бы подпоследовательность, отделенную от нуля.

Ясно, что

$$0 < g(w_j) \leq \gamma_{k_j},$$

откуда

$$\lim_{j \rightarrow \infty} g(w_j) = 0.$$

В результате, в силу произвольного выбора последовательности  $w_j$ , имеем  $\lim_{t \rightarrow 0+} g(t) = 0$ , таким образом, функция  $g$  является непрерывной в точке 0.

Ясно, что

$$0 < \frac{g(w_j)}{w_j} \leq \frac{\gamma_{k_j}}{u_{k_j+1}}.$$

В силу условий (2.14) имеем

$$\lim_{j \rightarrow \infty} \frac{g(w_j)}{w_j} = 0,$$

откуда, в силу произвольного выбора последовательности  $w_j$ , имеем

$$\lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{g(t)}{t} = 0,$$

следовательно, функция  $g$  имеет в точке 0 правостороннюю производную равную нулю.

Рассмотрим производную функции  $g$  порядка  $i$ , где  $1 \leq i \leq r$ , на интервале  $(0, u_1)$ , получим

$$g^{(i)}(t) = \begin{cases} 0, & t \in [v_k, u_k], \\ (\gamma_k - \gamma_{k+1})(I_k)^{-1} h_k^{(i-1)}(t), & t \in [u_{k+1}, v_k] \end{cases}$$

Аналогично, пусть  $w_j$  – произвольная положительная последовательность, стремящаяся к нулю, тогда имеем

$$\begin{aligned} |g^{(i)}(w_j)| &\leq (\gamma_{k_j} - \gamma_{k_j+1})(I_{k_j})^{-1} H_{k_j}, \\ \frac{|g^{(i)}(w_j)|}{w_j} &\leq \frac{(\gamma_{k_j} - \gamma_{k_j+1})}{u_{k_j+1}} (I_{k_j})^{-1} H_{k_j}, \\ i &= 1, 2, \dots, r. \end{aligned}$$

Из последних условий, учитывая (2.14), получаем

$$\begin{aligned} \lim_{j \rightarrow \infty} |g^{(i)}(w_j)| &= 0, \\ \lim_{j \rightarrow \infty} \frac{|g^{(i)}(w_j)|}{w_j} &= 0, \\ i &= 1, 2, \dots, r. \end{aligned}$$

Из этих соотношений следует, что

$$\lim_{t \rightarrow 0^+} |g^{(i)}(t)| = 0,$$

$$\lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{|g^{(i)}(t)|}{t} = 0,$$

таким образом, функция  $g$  имеет в точке  $0$   $r$  непрерывных правосторонних производных, равных  $0$ .

Теорема 2.3 доказана.

Окончательно, если доопределить функцию  $g$ , заданную формулами (2.15), на интервал  $(-u_1, u_1)$  с сохранением класса гладкости, то построенная таким способом функция  $g$ , удовлетворяет условиям (2.8), (2.9).

Таким образом, если выполнены условия (2.1)-(2.7), (2.10), а функция  $g$  на промежутке  $[0, u_1)$  задана формулами (2.15) и продолжена на  $(-u_1, u_1)$  с сохранением гладкости, то исходный диффеоморфизм имеет счетное множество устойчивых периодических точек с отделенными от нуля характеристическими показателями.

Заметим, что условия (2.3), (2.10) наложены на функции  $p, q$ , поэтому следует указать способ построения таких функций. Для этого, зафиксируем последовательности, определяющие свойства функции  $g$  следующим образом. Пусть  $\sigma > 0, \theta > 0$  такие, что

$$\begin{aligned} \max \left[ (\lambda \mu)^{(r+1)^{-1}}, \mu^{-(r+1)^{-1}} \right] &< \sigma < 1, \\ (\lambda + \theta)(\mu + \theta) &< \sigma < 1, \\ (1 + \theta \lambda^{-1})\sigma &< 1. \end{aligned} \tag{2.16}$$

В качестве последовательностей  $\sigma_k, \varepsilon_k, m_k$ , определенных при описании свойств функции  $g$ , удовлетворяющих (2.6), (2.7), возьмем

$$\begin{aligned} \sigma_k &= \sigma^k, \\ \varepsilon_k &= 2(\lambda + \theta)^k (\mu + \theta)^k, \\ m_k &= k. \end{aligned} \tag{2.17}$$

Проверим выполнение условий (2.6), пусть

$$A_k = \sigma^{-k} [\sigma^k - \varepsilon_k - \sigma^{k+1} - \varepsilon_{k+1}],$$

тогда

$$\lim_{k \rightarrow \infty} A_k = 1 - \sigma > 0,$$

следовательно, условия (2.6) выполняются для всех номеров  $k$ , начиная с некоторого  $k_0$ .

Пусть, как и ранее,

$$v_k = \sigma^k - \varepsilon_k,$$

$$u_k = \sigma^k + \varepsilon_k,$$

где  $\varepsilon_k$  определены в (2.17).

На каждом промежутке  $[u_{k+1}, v_k]$  определим неотрицательную, не равную тождественно нулю, функцию  $h_k(t)$  класса  $C^{r-1}$ , удовлетворяющую свойствам (2.12). Предположим, что имеют место следующие соотношения

$$\lim_{k \rightarrow \infty} [\mu^{-k} H_k(I_k)^{-1} \sigma^{-(k+1)}] = 0,$$

последовательности  $H_k, I_k$  определены ранее, а сами соотношения есть условия (2.14) в нашем случае.

Покажем, что в качестве функций  $h_k(t)$  можно взять функции

$$h_k(t) = [R_k^2 - (t - S_k)^2]^r, \quad (2.18)$$

где

$$R_k = 0.5(v_k - u_{k+1}),$$

$$S_k = 0.5(u_{k+1} + v_k),$$

причем, ясно, что

$$\lim_{k \rightarrow \infty} 2\sigma^{-k} R_k = 1 - \sigma > 0,$$

$$\lim_{k \rightarrow \infty} 2\sigma^{-k} S_k = 1 + \sigma > 0.$$

В случае если функции  $h_k(t)$  заданы формулами (2.18), то

$$I_k = \int_{u_{k+1}}^{v_k} \left[ R_k^2 - (t - S_k)^2 \right]^r dt = r! 2^{2r+1} [(2r+1)!]^{-1} R_k^{2r+1}.$$

Для того, что бы оценить элементы последовательности  $H_k$ , вычислим производные функции  $h_k(t)$  до порядка  $r - 1$  включительно, получим

$$\begin{aligned} h_k^{(i)}(t) &= \left[ (R_k - (t - S_k))^r (R_k + (t - S_k))^r \right]^{(i)} = \\ &= \sum_{j=0}^i C_i^j \left[ (R_k - (t - S_k))^r \right]^{(j)} \left[ (R_k + (t - S_k))^r \right]^{(i-j)} = \\ &= \sum_{j=0}^i C_i^j r(r-1)\dots(r-j+1)(-1)^j (R_k - (t - S_k))^{r-j} r\dots(r-i+j+1)(R_k + (t - S_k))^{r-i+j} \end{aligned}$$

(где  $C_i^j$  – число сочетаний).

Из последних соотношений следует, что при  $t \in [u_{k+1}, v_k]$  и фиксированном номере  $k$ , существует положительная постоянная  $K$ , зависящая от  $r, i$ , но не зависящая от  $k$ , такая, что

$$\left| h_k^{(i)}(t) \right| \leq KR_k^{2r-i}, \text{ где } i=0, 1, \dots, r-1$$

Из последних неравенств следует существование положительной постоянной  $H$ , независящей от  $k$ , такой, что  $0 < H_k \leq HR_k^{r+1}$ .

Легко видеть, что из условий (2.16), (2.17), (2.18) следует соотношение (2.14).

Пусть выполнены условия (2.16), (2.17), (2.18), (2.14), функция  $g$  задана формулами (2.15) и продолжена на интервал  $(-\sigma^{k_0}, \sigma^{k_0})$  с сохранением класса гладкости. При этих предположениях построим функции  $p, q$ , с вышеперечисленными свойствами.

Пусть

$$\eta = -\frac{\ln \lambda}{\ln \mu} > 1.$$

Зафиксируем натуральное число  $\omega$ , удовлетворяющее следующим свойствам



$$\begin{aligned} \omega &> r, \\ \omega &> \eta^{-1} \left( 1 + \beta \frac{\ln(\mu + \theta)}{\ln \mu} \right), \\ \omega &> -\eta^{-1} (\ln \mu)^{-1} (\ln(\lambda + \theta) + \ln \sigma). \end{aligned} \quad (2.19)$$

Определим

$$t_k = x_k^\omega y_k^\omega,$$

где, как и ранее,

$$\begin{aligned} x_k &= (x^0 + b\sigma_k)(1 - \lambda^{m_k} a)^{-1}, \\ y_k &= (y^0 + \sigma_k)\mu^{-m_k}, \end{aligned}$$

а последовательности  $\sigma_k, \varepsilon_k, m_k$  определены в (2.17). Ясно, что

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \mu^{k\omega\eta} t_k = (x^0)^\omega (y^0)^{\omega\eta} > 0.$$

Наряду с последовательностью  $t_k$ , введем в рассмотрение последовательности

$$\begin{aligned} \tau_k &= \left[ x_k - (1 + \theta\lambda^{-1})^k \sigma^k \right]^\omega \left[ y_k - d\varepsilon_k \mu^{-k} \right]^{\omega\eta}, \\ \nu_k &= \left[ x_k + (1 + \theta\lambda^{-1})^k \sigma^k \right]^\omega \left[ y_k + d\varepsilon_k \mu^{-k} \right]^{\omega\eta}. \end{aligned}$$

Ясно, что справедливы неравенства

$$0 < \tau_k < t_k < \nu_k.$$

В силу условий (2.16), имеем

$$\begin{aligned} \lim_{k \rightarrow \infty} \mu^{k\omega\eta} \tau_k &= \lim_{k \rightarrow \infty} \mu^{k\omega\eta} \nu_k = (x^0)^\omega (y^0)^{\omega\eta}, \\ \lim_{k \rightarrow \infty} \mu^{k\omega\eta} (\nu_k - \tau_{k+1}) &= (x^0)^\omega (y^0)^{\omega\eta} (1 - \mu^{-\omega\eta}) > 0. \end{aligned}$$

Ранее определенная для любого фиксированного  $k$  последовательность множеств  $B_k^j$  имеет вид

$$B_k^j = \left\{ (x, y) : |x - \lambda^j x_k| < (\lambda + \theta)^j \sigma^k, |y - \mu^j y_k| < d\varepsilon_k (\mu + \theta)^{j-k} \right\},$$

где  $j = 0, 1, \dots, k-1$ .

**Лемма 2.2.** Пусть выполнены условия (2.16), (2.17), (2.19), определены последовательности  $\tau_k, \nu_k$ , тогда при любых  $(x, y) \in B_k^j$ , где  $j=0, 1, \dots, k-1$  справедливо следующее неравенство

$$\tau_k < x^\omega y^{\omega\eta} < \nu_k, \quad (2.20)$$

где  $(x, y) \in B_k^j$ ,  $j = 0, 1, \dots, k-1$ .

**Доказательство.** Пусть  $(x, y) \in B_k^j$ , запишем

$$\begin{aligned} x &= \lambda^j x_k + z_1(k), \\ y &= \mu^j y_k + z_2(k), \end{aligned}$$

где

$$\begin{aligned} |z_1(k)| &< (\lambda + \theta)^j \sigma^k, \\ |z_2(k)| &< d\varepsilon_k (\mu + \theta)^{j-k}, \end{aligned}$$

откуда

$$\begin{aligned} x^\omega y^{\omega\eta} &= (\lambda^j x_k + z_1(k))^\omega (\mu^j y_k + z_2(k))^{\omega\eta} = \\ &= (\lambda\mu^\eta)^{\omega j} (x_k + \lambda^{-j} z_1(k))^\omega (y_k + \mu^{-j} z_2(k))^{\omega\eta}. \end{aligned}$$

Рассмотрим

$$\begin{aligned} |z_1(k)\lambda^{-j}| &< (1 + \theta\lambda^{-1})^j \sigma^k < (1 + \theta\lambda^{-1})^k \sigma^k, \\ |z_2(k)\mu^{-j}| &< d\varepsilon_k (1 + \theta\mu^{-1})^j (\mu + \theta)^{-k} < d\varepsilon_k \mu^{-k}, \end{aligned}$$

где  $j = 0, 1, \dots, k-1$ .

Из последних неравенств следует утверждение леммы.

Лемма 2.2 доказана.

Следующая теорема определяет множество функций, удовлетворяющих условиям (2.10).

**Теорема 2.4.** Пусть выполнены условия (2.16), (2.17), а  $F(t)$  – произвольная функция класса  $C^r$  на  $(-\delta, \delta)$ , где  $\delta > 0$ , такая, что  $|F(t)| \leq t, |F'(t)| \leq 1$ , при любом  $t$ . Определим

$$p(x, y) = q(x, y) = F(x^\omega y^{\omega\eta}), (x, y) \in V_1, \quad (2.21)$$

тогда функции  $p, q$ , являются функциями класса  $C^r$  в  $V_1$  и удовлетворяют условиям (2.10).

**Доказательство.** Зафиксируем  $k$  и оценим

$$|p(x_k, y_k)| = |q(x_k, y_k)| = |F(x_k^\omega y_k^{\omega\eta})| \leq x_k^\omega y_k^{\omega\eta} = t_k.$$

Из свойств последовательности  $t_k$  следует, что существует постоянная  $N > 0$  такая, что

$$0 < t_k \leq \mu^{-k\omega\eta} N.$$

Кроме того, из условий (2.19) имеем

$$\mu^{-\omega\eta} < (\lambda + \theta)\sigma,$$

откуда следует, что при достаточно больших номерах  $k$  справедливы следующие неравенства

$$|p(x_k, y_k)| \leq \mu^{-k\omega\eta} N < (\lambda + \theta)^k \sigma^k \leq (\lambda + \theta)^j \sigma^k,$$

где  $j = 0, 1, \dots, k-1$ .

Аналогично, имеем

$$|q(x_k, y_k)| \leq N \mu^{-\omega\eta k},$$

в силу (2.19) имеем

$$\mu^{-\omega\eta} < \lambda + \theta,$$

таким образом, получим

$$|q(x_k, y_k)| < d\theta(\lambda + \theta)^k \leq 0.5d\theta\varepsilon_k (\mu + \theta)^{j-k},$$

последние неравенства справедливы для достаточно больших  $k$  и  $j = 0, 1, \dots, k-1$ .

Оценим производную по  $x$  функции  $p$  при  $(x, y) \in B_k^j$ , получим с учетом (2.19), (2.20),

$$\left| \frac{\partial p(x, y)}{\partial x} \right| = \omega \left| F'(x^\omega y^{\omega\eta}) \right| x^\omega y^{\omega\eta} x^{-1} \leq \omega \nu_k x^{-1}.$$

Если точка  $(x, y) \in B_k^j$ , то

$$x > \lambda^j \left( x_k - (1 + \theta \lambda^{-1})^j \sigma^k \right) > \lambda^k \left( x_k - (1 + \theta \lambda^{-1})^k \sigma^k \right),$$

причем

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \left[ x_k - (1 + \theta \lambda^{-1})^k \sigma^k \right] = x^0 > 0.$$

В результате, получим, что существует постоянная  $L_1 > 0$ , не зависящая от  $j$ , такая, что

$$\left| \frac{\partial p(x, y)}{\partial x} \right| \leq L_1 (\lambda \mu^{\omega\eta})^{-k}.$$

Окончательно имеем, что при  $(x, y) \in B_k^j$ , для достаточно больших  $k$  и произвольного  $j = 0, 1, \dots, k-1$ ,

$$\left| \frac{\partial p(x, y)}{\partial x} \right| < 0.25\theta.$$

Аналогично, оценим производную функции  $p$  по  $y$  при  $(x, y) \in B_k^j$ , получим

$$\left| \frac{\partial p(x, y)}{\partial y} \right| = \omega \eta \left| F'(x^\omega y^{\omega\eta}) \right| x^\omega y^{\omega\eta} y^{-1} \leq \omega \eta \nu_k y^{-1}.$$

При  $(x, y) \in B_k^j$ , имеем

$$y > \mu^{j-k} \left( y^0 + \sigma^k - d \varepsilon_k (1 + \theta \mu^{-1})^{j-k} \right) > \mu^{-k} \left( y^0 + \sigma^k - d \varepsilon_k \right).$$

В результате, получим, что существует постоянная  $L_2 > 0$ , не зависящая от  $j$ , такая, что

$$\left| \frac{\partial p(x, y)}{\partial y} \right| \leq L_2 \mu^{-(\omega\eta-1)k}.$$

В силу условий (2.19) имеем

$$\mu^{\omega\eta-1} > (\mu + \theta)^\beta,$$

откуда следует, что при  $j = 0, 1, \dots, k-1$ ,

$$\left| \frac{\partial p(x, y)}{\partial y} \right| < (\mu + \theta)^{-\beta k}.$$

Продифференцируем функцию  $q$  при  $(x, y) \in B_k^j$ , получим

$$\left| \frac{\partial q(x, y)}{\partial x} \right| \leq L_1 (\lambda \mu^{\omega\eta})^{-k},$$

$$\left| \frac{\partial q(x, y)}{\partial y} \right| \leq L_2 \mu^{-(\omega\eta-1)k}.$$

В силу условий (2.19), имеем  $\lambda \mu^{\omega\eta} > (\mu + \theta)^\beta$ , поэтому при  $(x, y) \in B_k^j$  справедливы неравенства

$$\left| \frac{\partial q(x, y)}{\partial x} \right| < (\mu + \theta)^{-\beta k},$$

$$\left| \frac{\partial q(x, y)}{\partial y} \right| < 0.25\theta.$$

Последние неравенства доказывают теорему 2.4.

Таким образом, если функции  $g, p, q$  удовлетворяют условиям теорем 2.3, 2.4, тогда диффеоморфизм  $f$  имеет счетное множество устойчивых периодических точек, характеристические показатели которых отделены от нуля.

## 2.2 БЕСКОНЕЧНО ГЛАДКИЕ ДИФФЕОМОРФИЗМЫ ПЛОСКОСТИ

В этом разделе рассматривается диффеоморфизм  $f$  плоскости в себя класса  $C^\infty$  с седловой неподвижной точкой в начале координат. Так же, как в предыдущем разделе, предполагается, что в некоторой окрестности нуля  $V$  диффеоморфизм  $f$  задан формулами (2.1), точнее

$$f \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \lambda x + p(x, y) \\ \mu y + q(x, y) \end{pmatrix},$$

где функции  $p, q$  в начале координат равны нулю вместе со своими производными первого порядка. Предполагаем, что выполнены условия (2.2), (2.3).

Аналогично, предполагается наличие нетрансверсальной гомоклинической точки. Пусть точка  $(0, y^0)$ , где  $y^0 \neq 0$ , принадлежит  $V$  и является гомоклинической, т.е.  $(0, y^0) \in W^s(0) \cap W^u(0)$ . Ясно, что существует точка  $(x^0, 0) \in V$ ,  $x^0 \neq 0$ , и натуральное число  $n$  такое, что

$$f^n \begin{pmatrix} 0 \\ y^0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x^0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Считаем, что выполнены условия (2.4).

Предположим, что

$$V_1 = \{(x, y) : |x| < \lambda^{-1}x^0, |y| < \mu y^0\} \subset V.$$

Обозначим через  $U$  такую выпуклую окрестность точки  $(0, y^0)$ , что  $U \subset V_1, f^n(U) \subset V_1$ . Определим

$$L \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = f^n|_U \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x^0 + ax + b(y - y^0) + \varphi(x, y - y^0) \\ cx + g(y - y^0) + \psi(x) \end{pmatrix},$$

где  $a, b, c$  – действительные числа, а  $g, \varphi, \psi$  – функции класса  $C^\infty$  одной или двух переменных, определенные в окрестности точки 0. Считаем, что выполнены условия (2.5). Предположим, что функции  $g, \varphi, \psi$  равны нулю вместе со своими первыми производными в начале координат. Пусть в окрестности  $U$  все производные первого порядка у функций  $\varphi, \psi$  ограничены постоянной  $M > 0$ .

Обозначим через  $d$  следующую величину

$$d = \min \left[ 0.25, 0.25(|b| + M)^{-1} \right].$$

Фиксируем  $\theta \geq 0$  такую, что

$$\begin{aligned} 0 < \lambda - \theta < \lambda + \theta < 1 < \mu - \theta, \\ (\lambda + \theta)(\mu + \theta) < 1. \end{aligned}$$

Касание устойчивого и неустойчивого многообразий в точке  $(x^0, 0)$  определяется свойствами функции  $g$ . Эти свойства были описаны в предыдущем разделе этой главы для диффеоморфизма класса  $C^r, 1 \leq r < \infty$ . В данном разделе рассматривается бесконечно гладкий диффеоморфизм, и, поэтому, функция  $g$  является функцией класса  $C^\infty$  в окрестности нуля.

Касание устойчивого и неустойчивого многообразий в точке  $(x^0, 0)$  определяется свойствами функции  $g$ , характер касания описывается с помощью последовательностей. Пусть  $\sigma_k, \varepsilon_k$  – положительные, стремящиеся к нулю, последовательности действительных чисел, причем последовательность  $\sigma_k$  убывает. Считаем, что выполнены условия (2.6).

Пусть  $m_k$  – строго возрастающая последовательность натуральных чисел, удовлетворяющая условиям (2.7). Обозначим

$$\begin{aligned} x_k &= (x^0 + b\sigma_k)(1 - \lambda^{m_k} a)^{-1}, \\ y_k &= (y^0 + \sigma_k)\mu^{-m_k}. \end{aligned}$$

Пусть  $g$  – функция одной переменной класса  $C^\infty$ , определенная в окрестности точки 0, удовлетворяющая условиям (2.8), (2.9).

Справедлива следующая теорема.

**Теорема 2.5.** Пусть  $f$  – диффеоморфизм плоскости в себя класса  $C^\infty$  с неподвижной седловой точкой в начале координат. Предполагается наличие нетрансверсальной гомоклинической точки. Пусть выполнены (2.1)-(2.9), предположим, что функции  $p, q$ , определенные в (2.1), тождественно равны нулю в окрестности  $V$  начала координат, тогда  $f$  имеет счетное множество устойчивых периодических точек с характеристическими показателями, отделенными от нуля.

Доказательство теоремы для случая диффеоморфизма класса  $C^1$  приведено в главе 1 (раздел 1), это доказательство годится как для случая диффеоморфизма класса  $C^r$  ( $1 \leq r < \infty$ ), так и для случая диффеоморфизма класса  $C^\infty$ , потому что они являются частными случаями диффеоморфизмов класса  $C^1$ .

Из вышеперечисленных свойств функции  $g$  следует теорема.

**Теорема 2.6.** Пусть функция  $g$  является функцией класса  $C^\infty$  в окрестности нуля. Пусть выполнены условия (2.6), (2.8), (2.9), тогда

$$g^{(i)}(0) = 0 \text{ для любого } i = 0, 1, \dots$$

Аналогичная теорема сформулирована и доказана в предыдущем разделе.

Применив формулу Тейлора к  $g$ , получим  $g(\sigma_k) = o(\sigma_k^i)$  для любого  $i$ , откуда  $\lim_{k \rightarrow \infty} \mu^{-m_k} (\sigma_k)^{-i} = 0$  при любом  $i$ .

Далее в этом разделе представлен способ построения множества бесконечно дифференцируемых функций, удовлетворяющих условиям (2.8), (2.9).

Пусть  $\sigma_k, \varepsilon_k$  – произвольные положительные последовательности, удовлетворяющие всем вышеперечисленным свойствам, т.е. они стремятся к нулю,  $\sigma_k$  убывают, и выполнено условие (2.6).



Пусть

$$v_k = \sigma_k - \varepsilon_k, u_k = \sigma_k + \varepsilon_k.$$

Легко видеть, что

$$v_k - u_{k+1} > 0.$$

На каждом промежутке  $[u_{k+1}, v_k]$  рассмотрим функцию  $h_k(t)$  класса  $C^\infty$ , неотрицательную, не равную тождественно нулю, и такую, что

$$\begin{aligned} h_k^{(i)}(u_{k+1}) = h_k^{(i)}(v_k) = 0, \\ i = 0, 1, \dots \end{aligned} \tag{2.22}$$

Обозначим, как и ранее,

$$\begin{aligned} I_k &= \int_{u_{k+1}}^{v_k} h_k(t) dt, \\ h_{ki} &= \max_{t \in [u_{k+1}, v_k]} |h_k^{(i)}(t)|, \\ i &= 0, 1, \dots \end{aligned}$$

Легко видеть, что

$$0 < I_k \leq h_{k0} (v_k - u_{k+1}).$$

Из доказательства леммы 2.1 следует, что при фиксированном  $k$  при любом целом неотрицательном  $i$  справедливы неравенства

$$h_{ki} \geq \frac{h_{k0}}{(v_k - u_{k+1})^i}, i = 0, 1, \dots$$

В отличие от случая диффеоморфизма конечной гладкости, рассмотренного в предыдущем разделе, в этом случае для любого фиксированного  $k$  имеется бесконечная последовательность положительных действительных чисел  $h_{ki}$ . Очевидно, что в этом случае при произвольном выборе функций  $h_k(t)$  мы не можем утверждать, что при любом фиксированном  $k$  существует постоянная положительная  $H_k$ , ограничивающая  $h_{ki}$ .

Пусть последовательность  $m_k$  и функции  $h_k(t)$  таковы, что справедливы следующие соотношения

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \mu^{-m_k} h_{ki}(I_k)^{-1} (u_{k+1})^{-1} = 0, i = 0, 1, \dots \quad (2.23)$$

Обозначим

$$\gamma_k = \mu^{-m_k} (y^0 + \sigma_k) - \lambda^{m_k} c(x^0 + b\sigma_k)(1 - \lambda^{m_k} a)^{-1}.$$

Имеет место следующая теорема.

**Теорема 2.7.** Пусть выполнены условия (2.6), и на каждом промежутке  $[u_{k+1}, v_k]$  задана функция  $h_k(t)$ , класса  $C^\infty$ , неотрицательная, не равная тождественно нулю, удовлетворяющая условиям (2.22). Пусть выполнены условия (2.23), тогда функция  $g$ , определенная как

$$g(t) = \begin{cases} (\gamma_k - \gamma_{k+1})(I_k)^{-1} \int_{u_{k+1}}^t h_k(\tau) d\tau + \gamma_{k+1}, & t \in [u_{k+1}, v_k] \\ \gamma_k, & t \in [v_k, u_k] \\ 0, & t = 0 \end{cases} \quad (2.24)$$

является функцией класса  $C^\infty$  на  $[0, \sigma_1)$ .

**Доказательство.** Пусть  $w_j$  – произвольная положительная последовательность, стремящаяся к нулю. По любому номеру  $j$  найдется номер  $k_j$  такой, что  $w_j \in [u_{k_j+1}, u_{k_j})$ , причем

$$\lim_{j \rightarrow \infty} k_j = +\infty.$$

Применяя аналогичные рассуждения, как в теореме 2.3 предыдущего раздела, получим с учетом (2.23)

$$\lim_{j \rightarrow \infty} |g^{(i)}(w_j)| = 0,$$

$$\lim_{j \rightarrow \infty} \left| \frac{g^{(i)}(w_j)}{w_j} \right| = 0,$$

$$i = 0, 1, \dots$$

Последние соотношения справедливы для всех целых неотрицательных  $i$  в случае произвольной последовательности  $w_j$ , поэтому ясно, что функция  $g$ , определенная в (2.24), является функцией класса  $C^\infty$  на  $[0, \sigma_1)$ , причем  $g^{(i)}(0) = 0, i = 0, 1, \dots$

Теорема 2.7 доказана.

Функцию  $g$  можно доопределить на  $(-\sigma_1, \sigma_1)$  с сохранением класса гладкости, т.е. в точке нуль сама функция и все ее производные должны быть равны нулю.

Следующая теорема посвящена вопросу существования функции  $h_k(t)$ , удовлетворяющей условиям (2.22), (2.23).

**Теорема 2.8.** Пусть выполнены условия (2.6) и на каждом промежутке  $[u_{k+1}, v_k]$  задана функция

$$h_k(t) = \exp\left[(t - s_k)^2 - r_k^2\right]^{-1}, \quad (2.25)$$

где

$$s_k = 0.5(u_{k+1} + v_k),$$

$$r_k = 0.5(v_k - u_{k+1}),$$

тогда выполняются условия (2.22), и существует строго возрастающая последовательность натуральных чисел  $t_k$  такая, что выполняются условия (2.7), (2.23).

**Доказательство.** Известно, что функцию  $h_k(t)$  при фиксированном  $k$  можно доопределить нулем на концах промежутка  $[u_{k+1}, v_k]$ , в этом случае условия (2.22) имеют место.

Зафиксируем  $k$  и обозначим

$$\tau = t - s_k,$$

и определим

$$\bar{h}_k(\tau) = \exp[\tau^2 - r_k^2]^{-1} = h_k(\tau + s_k).$$

Ясно, что

$$\bar{h}'_k(\tau) = -2\tau(\tau^2 - r_k^2)^{-2} \exp[\tau^2 - r_k^2]^{-1},$$

покажем по индукции, что

$$\bar{h}_k^{(i)}(\tau) = P_{3i-2}(\tau)(\tau^2 - r_k^2)^{-2i} \exp[\tau^2 - r_k^2]^{-1}, \quad (2.26)$$

где  $P_{3i-2}(\tau)$  – многочлен степени  $3i-2$  от  $\tau$ , причем коэффициенты этого многочлена зависят от  $i$  и  $r_k$ . База индукции очевидна, установим индукционный переход, для этого продифференцируем функцию  $\bar{h}_k(\tau)$   $i+1$  раз, получим

$$\bar{h}_k^{(i+1)}(\tau) = P_{3i+1}(\tau)(\tau^2 - r_k^2)^{-2(i+1)} \exp[\tau^2 - r_k^2]^{-1},$$

где

$$P_{3i+1}(\tau) = (\tau^2 - r_k^2)^2 P'_{3i-2}(\tau) - 2\tau(2iP_{3i-2}(\tau)(\tau^2 - r_k^2) + P_{3i-2}(\tau)).$$

Ясно, что  $P_{3i+1}(\tau)$  – многочлен степени  $3i+1$  от  $\tau$ . Таким образом, формула (2.26) доказана.

Известно, что

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} x^k \exp(x^{-1}) = 0, \\ k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots,$$

откуда

$$\bar{h}_k^{(i)}(-r_k) = \bar{h}_k^{(i)}(r_k) = 0, \\ k = 0, 1, \dots,$$

в свою очередь, с учетом определения  $\tau$ , имеем

$$\begin{aligned} h_k^{(i)}(u_{k+1}) &= h_k^{(i)}(v_k) = 0, \\ i &= 0, 1, \dots \end{aligned}$$

Легко видеть, что при фиксированном  $i$  многочлен  $P_{3i-2}(\tau)$  ограничен при  $\tau \in [-r_k, r_k]$ . Более того, из предыдущих рассуждений следует, что существует постоянная  $N(i)$ , не зависящая от  $k$ , такая, что

$$\begin{aligned} |P_{3i-2}(\tau)| &\leq N(i), \\ \tau &\in [-r_k, r_k], \end{aligned}$$

при любых  $k = 1, 2, \dots$ .

Оценим производную порядка  $i$  функции  $\bar{h}_k(\tau)$  на промежутке  $[-r_k, r_k]$ , для этого рассмотрим на этом промежутке при фиксированном  $i$  следующую функцию

$$\chi(\tau) = (\tau^2 - r_k^2)^{-2i} \exp[\tau^2 - r_k^2]^{-1}.$$

Ясно, что эта функция неотрицательна и обращается в нуль на концах промежутка. Продифференцируем эту функцию, получим

$$\chi'(\tau) = -2\tau [2i(\tau^2 - r_k^2) + 1] (\tau^2 - r_k^2)^{-2(i+1)} \exp[\tau^2 - r_k^2]^{-1}.$$

Из последнего соотношения следует, что, если  $r_k^2 < (2i)^{-1}$ , то функция  $\chi(\tau)$  достигает своего максимального значения на нашем промежутке при  $\tau = 0$ .

Следовательно, получим, что при фиксированном  $i$  для любого достаточно большого  $k$  справедливо неравенство

$$|\bar{h}_k^{(i)}(\tau)| \leq N(i) r_k^{-2i} \exp[-(r_k^{-2})],$$

где  $\tau \in [-r_k, r_k]$ .

Таким образом, если функции  $h_k(t)$  заданы формулами (2.25), где  $t \in [u_{k+1}, v_k]$ , то, учитывая последние неравенства и определение  $\tau$ , имеем

$$\lim_{k \rightarrow \infty} h_{ki} = 0, i = 0, 1, 2, \dots$$

Из свойств интеграла следует, что

$$r_k \exp\left(-\frac{4}{3}r_k^{-2}\right) \leq I_k \leq 2r_k \exp(-r_k^{-2}).$$

Определим

$$\zeta_k = (\ln \mu)^{-1} \ln(I_k u_{k+1})^{-1},$$

ясно, что

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \zeta_k = +\infty.$$

Кроме того, пусть  $l_k$  – возрастающая последовательность натуральных чисел такая, что  $(\lambda + \theta)^{l_k} (\mu + \theta)^{l_k} < \varepsilon_k$ , определим

$$m_k = \max_{1 \leq i \leq k} [\zeta_i] + l_k,$$

где [...] – целая часть числа.

В результате, определили последовательность  $m_k$ , удовлетворяющую условиям (2.7), и показали, что если на каждом промежутке  $[u_{k+1}, v_k]$  функцию  $h_k(t)$  определить формулами (2.25), то условия (2.23) выполняются.

Теорема 2.8 доказана.

Окончательно, пусть выполнены условия теорем 2.7, 2.8, тогда, функция  $g$  удовлетворяет условиям (2.8), (2.9). Доопределив функцию  $g$  как функцию класса  $C^\infty$  на  $(-\sigma_1, \sigma_1)$  произвольным образом, получим искомую функцию.

Зафиксируем положительную  $\theta$  и при любом фиксированном  $k$  рассмотрим конечную последовательность множеств

$$B_k^j = \left\{ (x, y) : |x - \lambda^j x_k| < (\lambda + \theta)^j \sigma_k, |y - \mu^j y_k| < d \varepsilon_k (\mu + \theta)^{j-m_k} \right\},$$

где  $j = 0, 1, \dots, m_k$ . Считаем, что  $B_k^j \subset V_1$ .

Фиксируем произвольную положительную  $\beta$  такую, что

$$\beta > -\frac{\ln(\lambda + \theta)}{\ln(\mu + \theta)} > 1.$$

**Теорема 2.9.** Пусть  $f$  – диффеоморфизм плоскости в себя класса  $C^\infty$  с неподвижной седловой точкой в начале координат. Предполагается наличие нетрансверсальной гомоклинической точки. Пусть выполнены условия (2.1)-(2.9). Предположим, что функции  $p, q$ , определенные в (2.1), удовлетворяют условиям (2.10) с положительной постоянной  $\theta$ , тогда  $f$  имеет счетное множество устойчивых периодических точек с характеристическими показателями, отделенными от нуля.

Доказательство теоремы приведено в разделе 2 главы 1 для  $C^1$ -гладкого диффеоморфизма, в связи с тем, что  $C^\infty$ -гладкий диффеоморфизм является частным случаем  $C^1$ -гладкого диффеоморфизма, доказательство теоремы 2.9 уже представлено.

Пусть, как и ранее,

$$\eta = -\frac{\ln \lambda}{\ln \mu} > 1,$$

предположим, что  $\eta$  рационально.

Перейдем к построению множества  $C^\infty$ -гладких функций  $p, q$ , удовлетворяющих условиям (2.3), (2.10), причем предполагается, что последовательности, определяющие свойства функции  $g$  фиксированы.

Справедлива следующая лемма.

**Лемма 2.2.** Пусть  $\sigma_k, \varepsilon_k$  – положительные последовательности, стремящиеся к нулю, причем  $\sigma_k$  убывают, и предположим, что выполнено условие (2.6). Пусть  $t_k$  – строго возрастающая последовательность натуральных чисел, такая, что выполнены условия (2.7), а  $g$   $C^\infty$ -гладкая функция, удовлетворяющая условиям (2.8), (2.9), тогда справедливо следующее соотношение

$$\lim_{k \rightarrow \infty} (1 + \theta \lambda^{-1})^{m_k} \sigma_k = +\infty. \quad (2.27)$$

**Доказательство.** Предположим, что утверждение леммы неверно, тогда существует положительная постоянная  $D$  и подпоследовательность номеров  $k_j$  такая, что

$$(1 + \theta \lambda^{-1})^{m_{k_j}} \sigma_{k_j} \leq D.$$

Однако, из доказательства теоремы 2.6 следует, что при любом целом неотрицательном  $i$  имеет место соотношение

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \mu^{m_k} (\sigma_k)^i = +\infty.$$

Зафиксируем натуральное число  $i$  такое, что

$$\mu(1 + \theta \lambda^{-1})^{-i} < 1,$$

ясно, что

$$(\sigma_{k_j})^i \leq D^i (1 + \theta \lambda^{-1})^{-im_{k_j}}.$$

Откуда

$$\lim_{j \rightarrow \infty} \mu^{m_{k_j}} D^i (1 + \theta \lambda^{-1})^{-im_{k_j}} = \lim_{j \rightarrow \infty} \mu^{m_{k_j}} (\sigma_{k_j})^i = 0.$$

Таким образом, соотношение (2.27) доказано.

Лемма 2.2 доказана.

Пусть  $\Delta$  натуральное число такое, что

$$\Delta \eta \in N, \quad (2.28)$$

и справедливы неравенства

$$\begin{aligned} \Delta &> -\eta^{-1} \ln [(\lambda + \theta)^2 (\mu + \theta)] [\ln \mu]^{-1}, \\ \Delta &> -[\beta \ln(\mu + \theta) + \ln \mu] [\ln(\lambda + \theta)]^{-1}, \\ \Delta &> 1 - \beta \ln(\mu + \theta) [\ln(\lambda + \theta)]^{-1}. \end{aligned} \quad (2.29)$$

Имеет место следующая теорема.



**Теорема 2.10.** Пусть  $F(t)$  – произвольная функция класса  $C^\infty$ , определенная в достаточно малой окрестности нуля такая, что

$$|F(t)| \leq |t|, |F'(t)| \leq 1.$$

Пусть выполнены условия (2.6)-(2.8), (2.28), (2.29), тогда функции  $p, q$ , определенные как

$$p(x, y) = q(x, y) = F(x^\Delta y^{\Delta\eta}), \quad (2.30)$$

являются  $C^\infty$ -гладкими функциями, удовлетворяющими условиям (2.3), (2.10).

**Доказательство.** Пусть функции  $p, q$  определены формулами (2.30). Ясно, что эти функции являются бесконечно дифференцируемыми в окрестности начала координат. Кроме того, они и их производные первого порядка равны нулю в нуле. Условия (2.3) выполнены очевидным образом. Осталось проверить выполнение условий (2.10).

Пусть

$$\tau_k = \mu^{\eta\Delta m_k} (x_k y_k^\eta)^\Delta,$$

ясно, что

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \tau_k = (x^0 (y^0)^\eta)^\Delta > 0.$$

В силу определения  $\eta$  имеем  $\lambda \mu^\eta = 1$ , следовательно,

$$|p(\lambda^j x_k, \mu^j y_k)| = \left| F\left( (x_k y_k^\eta)^\Delta \right) \right| \leq (x_k y_k^\eta)^\Delta = \mu^{-\Delta\eta m_k} \tau_k,$$

где  $j = 0, 1, \dots, m_k$ .

Из условий (2.29) следует, что  $\mu^{-\Delta\eta} < (\lambda + \theta)^2 (\mu + \theta)$ , откуда

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \left[ \mu^{-\Delta\eta} (\lambda + \theta)^{-2} (\mu + \theta)^{-1} \right]^{m_k} = 0.$$

Из последних соотношений следует, что

$$\mu^{-\Delta\eta} (\lambda + \theta)^{-1} = (\lambda + \theta)(\mu + \theta) s,$$

где  $0 < s < 1$ , откуда, учитывая свойства последовательностей  $\sigma_k, \varepsilon_k$ , получим

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \left[ \mu^{-\Delta\eta} (\lambda + \theta)^{-1} \right]^{m_k} (\varepsilon_k)^{-1} = \lim_{k \rightarrow \infty} \left[ \mu^{-\Delta\eta} (\lambda + \theta)^{-1} \right]^{m_k} (\sigma_k)^{-1} = 0.$$

В результате имеем, для достаточно больших номеров  $k$ ,

$$0 < \mu^{-\Delta\eta m_k} \tau_k < 0.5\theta(\lambda + \theta)^{m_k} \sigma_k, \text{ где } j = 0, 1, \dots, m_k.$$

Окончательно, получим

$$|p(\lambda^j x_k, \mu^j y_k)| < 0.5\theta(\lambda + \theta)^j \sigma_k, \quad (2.31)$$

где  $j = 0, 1, \dots, m_k - 1$ .

Продифференцируем функцию  $p$ , ясно, что

$$\begin{aligned} \frac{\partial p(x, y)}{\partial x} &= \Delta F'(x^\Delta y^{\Delta\eta}) x^{\Delta-1} y^{\Delta\eta}, \\ \frac{\partial p(x, y)}{\partial y} &= \Delta \eta F'(x^\Delta y^{\Delta\eta}) x^\Delta y^{\Delta\eta-1}. \end{aligned} \quad (2.32)$$

Зафиксируем  $k$  и  $j$  и рассмотрим  $(x, y) \in B_k^j$ , тогда можно представить  $x, y$  как

$$\begin{aligned} x &= \lambda^j x_k + z_1(k), \\ y &= \mu^j y_k + z_2(k), \end{aligned}$$

где

$$\begin{aligned} |z_1(k)| &< (\lambda + \theta)^j \sigma_k, \\ |z_2(k)| &< d\varepsilon_k (\mu + \theta)^{j-m_k}. \end{aligned}$$

Оценим

$$\begin{aligned} \left| \frac{\partial p(x, y)}{\partial x} \right| &\leq \Delta \left( \lambda^j x_k + |z_1(k)| \right)^{\Delta-1} \left( \mu^j y_k + |z_2(k)| \right)^{\Delta\eta} \leq \\ &\leq \Delta \lambda^{-j} \left( x_k + (1 + \theta\lambda^{-1})^j \sigma_k \right)^{\Delta-1} \left( y_k + d\varepsilon_k (\mu + \theta)^{-m_k} (1 + \theta\mu^{-1})^j \right)^{\Delta\eta} \leq \\ &\leq \Delta \lambda^{-m_k} \left( x_k + (1 + \theta\lambda^{-1})^{m_k} \sigma_k \right)^{\Delta-1} \left( y_k + d\varepsilon_k \mu^{-m_k} \right)^{\Delta\eta}. \end{aligned}$$

Рассмотрим произведение

$$(1 + \theta\lambda^{-1})^{-(\Delta-1)m_k} \sigma_k^{-(\Delta-1)} \lambda^{m_k} \left| \frac{\partial p(x, y)}{\partial x} \right|,$$

учитывая определение  $y_k$ , получим следующую оценку

$$\begin{aligned} & (1 + \theta\lambda^{-1})^{-(\Delta-1)m_k} \sigma_k^{-(\Delta-1)} \lambda^{m_k} \left| \frac{\partial p(x, y)}{\partial x} \right| \leq \\ & \leq \Delta \left( x_k (1 + \theta\lambda^{-1})^{-m_k} \sigma_k^{-1} + 1 \right)^{\Delta-1} (y^0 + \sigma_k + d\varepsilon_k)^{\Delta\eta} \mu^{-\Delta\eta m_k}. \end{aligned}$$

По лемме 2.2, имеем

$$\lim_{k \rightarrow \infty} (1 + \theta\lambda^{-1})^{-m_k} (\sigma_k)^{-1} = 0,$$

откуда

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \left( x_k (1 + \theta\lambda^{-1})^{-m_k} \sigma_k^{-1} + 1 \right)^{(\Delta-1)} (y^0 + \sigma_k + d\varepsilon_k)^{\Delta\eta} = (y^0)^{\Delta\eta} > 0,$$

таким образом, получим

$$\left| \frac{\partial p(x, y)}{\partial x} \right| \leq (\lambda + \theta)^{(\Delta-1)m_k} \sigma_k^{(\Delta-1)} S_1, \quad (2.33)$$

где  $S_1$  – постоянная положительная величина.

Из последнего неравенства следует, что при достаточно больших номерах  $k$  справедлива оценка

$$\begin{aligned} & \left| \frac{\partial p(x, y)}{\partial x} \right| < 0.25\theta, \\ & (x, y) \in B_k^j, j = 0, 1, \dots, m_k - 1. \end{aligned}$$

Аналогично оценим производную функции  $p$  по  $y$ . С учетом (2.29), (2.32) получим

$$\begin{aligned} \left| \frac{\partial p(x, y)}{\partial y} \right| &\leq \Delta \eta \left( \lambda^j x_k + |z_1(k)| \right)^\Delta \left( \mu^j y_k + |z_2(k)| \right)^{\Delta \eta - 1} \leq \\ &\leq \Delta \eta \mu^{-j} \left( x_k + (1 + \theta \lambda^{-1})^j \sigma_k \right)^\Delta \left( y_k + d \varepsilon_k (\mu + \theta)^{-m_k} (1 + \theta \lambda^{-1})^j \right)^{\Delta \eta - 1} \leq \\ &\leq \Delta \eta \left( x_k + (1 + \theta \lambda^{-1})^{m_k} \sigma_k \right)^\Delta \left( y_k + d \varepsilon_k \mu^{-m_k} \right)^{\Delta \eta - 1}. \end{aligned}$$

Кроме того, применяя аналогичные рассуждения, получим

$$\begin{aligned} (1 + \theta \lambda^{-1})^{-\Delta m_k} \sigma_k^{-\Delta} \left| \frac{\partial p(x, y)}{\partial y} \right| &\leq \\ &\leq \Delta \eta \left( x_k (1 + \theta \lambda^{-1})^{-m_k} \sigma_k^{-1} + 1 \right)^\Delta \left( y^0 + \sigma_k + d \varepsilon_k \right)^{\Delta \eta - 1} \mu^{-m_k (\Delta \eta - 1)} \end{aligned}$$

Откуда, по лемме 2.2 имеем

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \left( x_k (1 + \theta \lambda^{-1})^{-m_k} \sigma_k^{-1} + 1 \right)^\Delta \left( y^0 + \sigma_k + d \varepsilon_k \right)^{\Delta \eta - 1} = (y^0)^{\Delta \eta - 1} > 0.$$

В результате

$$\left| \frac{\partial p(x, y)}{\partial y} \right| \leq S_2 \mu^{m_k} (\lambda + \theta)^{\Delta m_k} (\sigma_k)^\Delta, \quad (2.34)$$

где  $S_2$  – положительная постоянная.

В силу условий (2.29), при достаточно больших  $k$  справедливы неравенства

$$\begin{aligned} \left| \frac{\partial p(x, y)}{\partial y} \right| &< (\mu + \theta)^{-\beta m_k}, \\ (x, y) &\in B_k^j, \\ j &= 0, 1, \dots, m_k - 1. \end{aligned}$$

Таким образом, соотношения (2.10) для функции  $p$  установлены, рассмотрим функцию  $q$ , определенную в (2.30), и проведем для нее аналогичные рассуждения. Требуется проверить выполнение условий (2.10) для функции  $q$ .

Сначала оценим

$$|q(\lambda^j x_k, \mu^j y_k)| = |F(x_k^\Delta y_k^{\Delta\eta})| \leq x_k^\Delta y_k^{\Delta\eta} = \mu^{-\Delta m_k \eta} \tau_k, \text{ где } j = 0, 1, \dots, m_k - 1.$$

Из условий (2.29) следует

$$\mu^{-\Delta\eta} < (\lambda + \theta)^2 (\mu + \theta) < \lambda + \theta,$$

откуда,

$$(\mu + \theta) \mu^{-\Delta\eta} = (\mu + \theta) (\lambda + \theta)^s, \text{ где } 0 < s < 1.$$

Следовательно, имеем  $\lim_{k \rightarrow \infty} [(\mu + \theta) \mu^{-\Delta\eta}]^{m_k} (\varepsilon_k)^{-1} = 0$ .

Из последних соотношений следует, что для достаточно больших номеров  $k$  справедливы неравенства

$$|q(\lambda^j x_k, \mu^j y_k)| < 0.5 \theta d \varepsilon_k (\mu + \theta)^{j - m_k}, \\ j = 0, 1, \dots, m_k - 1.$$

Производные первого порядка функции  $q$  совпадают с соответствующими производными функции  $p$ , которые представлены в (2.32). Ясно, что справедливы неравенства, аналогичные неравенствам (2.33), (2.34), которые имеют вид

$$\left| \frac{\partial q(x, y)}{\partial x} \right| \leq S_1 (\lambda + \theta)^{(\Delta-1)m_k} \sigma_k^{(\Delta-1)}, \\ \left| \frac{\partial q(x, y)}{\partial y} \right| \leq S_2 \mu^{m_k} (\lambda + \theta)^{\Delta m_k} \sigma_k^\Delta.$$

Из условий (2.29) и последних оценок, получим, что при достаточно больших  $k$ , справедливы неравенства

$$\left| \frac{\partial q(x, y)}{\partial x} \right| < (\mu + \theta)^{-\beta m_k}, \\ \left| \frac{\partial q(x, y)}{\partial y} \right| < 0.25 \theta, \\ (x, y) \in B_k^j, j = 0, 1, \dots, m_k - 1.$$

Теорема 2.10 доказана.

Таким образом, если  $\eta$  является рациональной величиной, а функции  $g$ ,  $p$ ,  $q$  являются функциями класса  $C^\infty$  и удовлетворяют условиям теорем 2.7, 2.10, тогда по теореме 2.5 диффеоморфизм  $f$  имеет счетное множество устойчивых периодических точек с отделенными от нуля характеристическими показателями.

Предположим, что  $\eta$ , определенная как  $\eta = -\frac{\ln \lambda}{\ln \mu}$ , является иррациональной величиной, тогда в малой окрестности нуля существует  $C^\infty$ -гладкое сопряжение диффеоморфизма  $f$  с линейным диффеоморфизмом, т.е. существует диффеоморфизм  $G$  класса  $C^\infty$  такой, что справедливо равенство  $f = G\bar{f}G^{-1}$ , где  $\bar{f}\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \lambda x \\ \mu y \end{pmatrix}$  в этой окрестности нуля, а вне этой окрестности  $\bar{f}$  совпадает с  $f$ .

Это утверждение следует из [35]. Если диффеоморфизм  $\bar{f}$  удовлетворяет теореме 2.5, тогда исходный диффеоморфизм  $f$  также имеет счетное множество устойчивых периодических точек с отделенными от нуля характеристическими показателями.

### ГЛАВА 3 МНОГОМЕРНЫЕ ДИФФЕОМОРФИЗМЫ

В главах 1, 2 диссертации рассматривался диффеоморфизм плоскости в себя с неподвижной гиперболической точкой в начале координат. Предполагалось наличие нетрансверсальной гомоклинической точки, доказывалось, что при определенных условиях, наложенных, прежде всего, на характер касания устойчивого и неустойчивого многообразий, диффеоморфизм имеет счетное множество устойчивых периодических точек с характеристическими показателями, отделенными от нуля.

Основная задача этой главы – показать, что этот результат имеет место и в случае диффеоморфизма многомерного пространства в себя.

Ранее окрестность нетрансверсальной гомоклинической точки многомерного диффеоморфизма изучалась во многих работах, например, [23, 25, 26, 34], однако, в этих работах рассматривается случай простейшего квадратичного касания устойчивого и неустойчивого многообразий.

В данной главе рассматривается иной способ касания этих многообразий, чем в упомянутых работах.

В этой главе рассматривается диффеоморфизм  $(n+m)$ -мерного пространства в себя с гиперболической неподвижной точкой в начале координат, предполагается существование нетрансверсальной гомоклинической точки, а именно, отличной от нуля точки, которая лежит в пересечении устойчивого и неустойчивого многообразий неподвижной точки, причем эти многообразия касаются в этой точке.

Цель главы – показать, что при выполнении некоторых условий, наложенных, прежде всего, на характер касания устойчивого и неустойчивого многообразий, окрестность гомоклинической точки

содержит счетное множество устойчивых периодических точек диффеоморфизма, характеристические показатели которых отделены от нуля.

Пусть  $f$  – указанный диффеоморфизм. В дальнейшем через  $\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$  обозначаются векторы  $(m+n)$ -мерного пространства, где

$$\begin{aligned} x &= \text{col}(x_1, \dots, x_m), \\ y &= \text{col}(y_1, \dots, y_n). \end{aligned}$$

Предположим, что  $f$  линеен в некоторой окрестности  $V$  точки  $0$ . В этой главе, в отличие от предыдущих глав, рассматриваются только такие диффеоморфизмы.

Пусть

$$f \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \Lambda x \\ My \end{pmatrix}, \quad (3.1)$$

где  $\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \in V$ , через  $\Lambda$  и  $M$  обозначены диагональные квадратные матрицы порядка  $m$  и  $n$  соответственно, а именно, эти матрицы имеют следующий вид

$$\begin{aligned} \Lambda &= \text{diag}[\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_m], \\ M &= \text{diag}[\mu_1, \mu_2, \dots, \mu_n]. \end{aligned}$$

Считаем, что  $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_m, \mu_1, \mu_2, \dots, \mu_n$  – действительные числа, и матрица  $Df(0)$  – диагональная матрица порядка  $m+n$ . В диссертации рассматривается только этот случай, однако, даже в этом самом простом случае при  $m > 1$  или  $n > 1$  доказательства соответствующих теорем становятся более сложными.

Предположим, что выполнены следующие неравенства

$$0 < \lambda_1 \leq \lambda_2 \leq \dots \leq \lambda_m < 1 < \mu_1 \leq \mu_2 \leq \dots \leq \mu_n. \quad (3.2)$$



Обозначим через

$$\begin{aligned}\lambda &= \lambda_m, \\ \mu &= \mu_1 \mu_2 \dots \mu_n.\end{aligned}$$

Пусть

$$\lambda \mu < 1. \quad (3.3)$$

Пусть  $W^s(0), W^u(0)$  – устойчивое и неустойчивое многообразия точки 0. Ясно, что в окрестности  $V$  многообразие  $W_{loc}^s(0)$  совпадает с линейным пространством, натянутым на оси  $(0, x_1), \dots, (0, x_m)$ , а многообразие  $W_{loc}^u(0)$  – с линейным пространством, натянутым на оси  $(0, y_1), \dots, (0, y_n)$ . Предположим, что существует нетрансверсальная гомоклиническая точка, а именно, пусть в пересечении устойчивого и неустойчивого многообразий лежит отличная от нуля точка.

Рассмотрим две точки из орбиты гомоклинической точки, лежащие в  $V$ .

Пусть  $(x_1^0, x_2^0, \dots, x_m^0, 0, \dots, 0)$ ,  $(0, \dots, 0, y_1^0, y_2^0, \dots, y_n^0)$  – координаты эти точек.

В дальнейшем будут приняты обозначения

$$\begin{aligned}x^0 &= \text{col}(x_1^0, \dots, x_m^0), \\ y^0 &= \text{col}(y_1^0, \dots, y_n^0).\end{aligned}$$

Пусть

$$x_i^0 > 0, \text{ где } i = 1, 2, \dots, m, \quad y_i^0 > 0, \text{ где } i = 1, 2, \dots, n. \quad (3.4)$$

Пусть

$$V_1 = \left\{ (x, y) : \|x\| < (\lambda_1)^{-1} \|x^0\|, \|y\| < \mu \|y^0\| \right\} \subset V,$$

где  $\|\dots\|$  – евклидова норма вектора.

Точки  $(x^0, 0), (0, y^0)$  принадлежат орбите гомоклинической точки, поэтому существует такое натуральное  $k$ , что

$$f^k \begin{pmatrix} 0 \\ y^0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x^0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Пусть  $U$  – такая выпуклая окрестность точки  $(0, y^0)$ , что

$$U \subset V_1, f^\kappa(U) \subset V_1.$$

Обозначим через  $L$  следующее сужение:  $L = f^\kappa|_U$ . Отображение  $L$  имеет класс гладкости  $C^1$ . Свойства этого отображения определяют характер касания устойчивого и неустойчивого многообразий в точке  $(x^0, 0)$ .

Опишем эти свойства подробнее.

Пусть  $\Omega = DL(0)$ , ясно, что это матрица порядка  $(m+n)$ . Считаем, что она имеет вид

$$\Omega = DL(0) = \begin{pmatrix} A & B \\ C & S \end{pmatrix},$$

где  $A$  и  $S$  квадратные матрицы порядка  $m$  и  $n$  соответственно.

Известно, что

$$\det \Omega > 0. \tag{3.5}$$

Предположим, что матрица  $S$  имеет следующий вид

$$S = \begin{pmatrix} 0 & s_{12} & s_{13} & \dots & s_{1n} \\ 0 & 0 & s_{23} & \dots & s_{2n} \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ 0 & 0 & 0 & \dots & s_{n-1n} \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 0 \end{pmatrix}, \tag{3.6}$$

т. е.  $s_{ij} = 0$ , если  $i \leq j$ .

Ясно, что  $\det S = 0$ , поэтому точка  $(x^0, 0)$  является точкой касания устойчивого и неустойчивого многообразий.

В предыдущих главах рассматривался двумерный диффеоморфизм, предполагалось, что  $m = n = 1$ , и матрица  $\Omega$  имела вид

$$\Omega = \begin{pmatrix} a & b \\ c & 0 \end{pmatrix}.$$

В многомерном случае, также, матрица  $S$  может быть нулевой, если это не противоречит условию (3.5). Однако, если, например,  $m = 1$ , а  $n \geq 2$ , то матрица  $S$  должна быть ненулевой. В качестве примера, можно рассмотреть случай, когда  $m = 1$ , а  $n = 2$ , причем матрицы  $\Omega$  и  $S$  имеют вид

$$\Omega = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

$$S = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Запишем отображение  $L$  следующим образом

$$L \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x^0 \\ 0 \end{pmatrix} + \Omega \begin{pmatrix} x \\ y - y^0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} \Phi(x, y - y^0) \\ G(y - y^0) + \Psi(x) \end{pmatrix}$$

или

$$f^\kappa|_U \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = L \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x^0 + Ax + B(y - y^0) + \Phi(x, y - y^0) \\ Cx + S(y - y^0) + G(y - y^0) + \Psi(x) \end{pmatrix}, \quad (3.7)$$

где  $\Phi$ ,  $\Psi$ ,  $G$  – непрерывно дифференцируемые вектор-функции, которые равны нулю вместе со своими частными производными при  $x = 0$  и  $y = y^0$ .

Рассмотрим подробнее свойства вектор-функции  $\Psi$ . В координатах

$$\Psi = \begin{pmatrix} \Psi_1 \\ \cdot \\ \cdot \\ \cdot \\ \Psi_n \end{pmatrix}.$$

Предположим, что для любого  $i = 1, 2, \dots, m$  функция  $\Psi_i$  зависит от  $(n+m-i)$  аргументов, а именно

$$\Psi_i = \Psi_i(x_1, \dots, x_m, y_{i+1} - y_{i+1}^0, \dots, y_n - y_n^0) \quad (3.8)$$

т.е.  $\Psi_1$  – функция  $(n + m - 1)$  аргумента,  $\Psi_n$  зависит только от  $x$ .

Пусть, существует такая положительная постоянная  $\bar{M}$ , что

$$\left\| \frac{\partial \Phi}{\partial x} \right\| \leq \bar{M}, \left\| \frac{\partial \Phi}{\partial y} \right\| \leq \bar{M}, \left\| \frac{\partial \Psi}{\partial x} \right\| \leq \bar{M}, \left\| \frac{\partial \Psi}{\partial y} \right\| \leq \bar{M}, \quad (3.9)$$

при  $(x, y) \in U$ .

Обозначим через  $\bar{d}$  следующую величину

$$\bar{d} = \max [n(\|S\| + \bar{M}), 1],$$

где  $\|S\|$  – норма матрицы  $S$ , согласованная с евклидовой векторной нормой.

Рассмотрим в координатах вектор-функцию  $G$ , т.е.

$$G(y - y^0) = \begin{pmatrix} G_1 \\ \cdot \\ \cdot \\ \cdot \\ G_n \end{pmatrix}.$$

Предположим, что  $G_i$  являются функциями  $i$  переменных, а именно,

$$G_i = G_i(y_1 - y_1^0, \dots, y_i - y_i^0), \quad (3.10)$$

где  $i = 1, 2, \dots, n$ , таким образом,  $G_1$  есть функция одной переменной, а  $G_n$  – функция  $n$  переменных.

Характер касания устойчивого и неустойчивого многообразий определяют свойства функции  $G$ , для описания которых надо рассмотреть несколько положительных последовательностей.

Пусть  $\sigma_k, \varepsilon_k$  – положительные последовательности, стремящиеся к нулю, причем последовательность  $\sigma_k$  убывает. Предположим, что для любого  $k$  верно следующее неравенство

$$\sigma_k - \varepsilon_k > \sigma_{k+1} + \varepsilon_{k+1}. \quad (3.11)$$

Пусть  $l_k$  – возрастающая последовательность натуральных чисел, такая что

$$(\lambda\mu)^{l_k} < \frac{\varepsilon_k}{(8d)^n}. \quad (3.12)$$

В дальнейшем уточним, насколько быстро  $l_k$  должны стремиться к бесконечности.

Пусть  $\xi_2^k, \xi_3^k, \dots, \xi_n^k$  – положительные последовательности такие, что при любых номерах  $k$  и  $i = 2, \dots, n$  справедливы неравенства

$$0 < \frac{\xi_i^k}{\lambda^{l_k}} \leq 1. \quad (3.13)$$

Обозначим через  $y_k, \xi_k$  следующие последовательности  $n$ -мерных векторов

$$\begin{aligned} \xi_k &= \text{col}(\sigma_k, \xi_2^k, \dots, \xi_n^k), \\ y_k &= y^0 + \xi_k. \end{aligned}$$

В дальнейшем элементы последовательности  $y_k$  обозначаются как  $y_k = \text{col}(y_1^k, \dots, y_n^k)$ .

Ясно, что при  $n = 1$  последовательности  $y_k, \xi_k$  являются обычными числовыми последовательностями.

Очевидно, что

$$\lim_{k \rightarrow \infty} y_k = y^0.$$

Ранее была введена диагональная матрица  $\Lambda$ , пусть  $\Lambda^{l_k}$  степень матрицы порядка  $l_k$ . Ясно, что при достаточно больших номерах  $k$   $\det[\Lambda^{l_k} A - E] \neq 0$ , поэтому можно определить последовательность  $m$ -мерных векторов

$$x_k = [E - \Lambda^{l_k} A]^{-1} \Lambda^{l_k} [x^0 + B\xi_k].$$

Ясно, что справедливо соотношение

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \|x_k\| = 0.$$

Пусть  $C_1, \dots, C_n, S_1, \dots, S_n$  – строки матриц  $C$  и  $S$  соответственно.

Обозначим через  $\Delta_i^k$ , где  $i = 1, 2, \dots, n$ , элементы следующих последовательностей

$$\Delta_1^k = \varepsilon_k, \quad \Delta_i^k = (4\bar{d})^{1-i} \varepsilon_k (\mu_1 \dots \mu_{i-1})^{-lk}.$$

Ясно, что

$$\Delta_1^k > \Delta_2^k > \dots > \Delta_n^k > 0,$$

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \Delta_i^k = 0, i = 1, 2, \dots, n.$$

Рассмотрим подробно свойства непрерывно дифференцируемой  $n$ -мерной функции  $G$ . Как отмечалось в (3.10),  $G_i$  является функцией  $i$  переменных, т.е.

$$G_i = G_i(y_1 - y_1^0, \dots, y_i - y_i^0), \text{ где } i = 1, \dots, n.$$

Пусть

$$\tau_k = G(\xi_k) - M^{-lk} y_k + Cx_k + S\xi_k,$$

т.е.  $\tau_k$  – последовательность  $n$ -мерных векторов, которая в координатах записывается как

$$\tau_k = \text{col}(\tau_1^k, \dots, \tau_n^k),$$

Причем

$$|\tau_1^k| = |G_1(\sigma_k) - \mu_1^{-lk} (y_1^0 + \sigma_k) + C_1 x_k + S_1 \xi_k|,$$

$$|\tau_i^k| = |G_i(\sigma_k, \xi_2^k, \dots, \xi_i^k) - \mu_i^{-lk} (y_i^0 + \xi_i^k) + C_i x_k + S_i \xi_k|,$$

где  $i = 2, \dots, n$ .

Предположим, что

$$\begin{aligned} |\tau_1^k| &< \frac{\varepsilon_k}{4\mu_1^{l_k}}, \\ |\tau_i^k| &< \frac{\Delta_i^k}{4\mu_i^{l_k}}, \end{aligned} \tag{3.14}$$

где  $i = 2, \dots, n$ .

Предположим, что существует постоянная величина  $\alpha > 1$  такая, что справедливы следующие неравенства

$$\begin{aligned} \left| \frac{dG_1(t_1)}{dt_1} \right| &< \mu^{-\alpha l_k}, t_1 \in (\sigma_k - \varepsilon_k, \sigma_k + \varepsilon_k), \\ \left| \frac{\partial G_i(t_1, \dots, t_i)}{\partial t_j} \right| &< \mu^{-\alpha l_k}, t_1 \in (\sigma_k - \varepsilon_k, \sigma_k + \varepsilon_k), t_s \in (\xi_s^k - \Delta_s^k, \xi_s^k + \Delta_s^k), \end{aligned} \tag{3.15}$$

где  $i = 2, \dots, n, j = 1, \dots, i, s = 2, \dots, i$ .

Функция  $G_1$  – непрерывно дифференцируемая функция одной переменной, ясно, что из (3.15) следует, что  $G_1(0) = G_1'(0) = 0$ , откуда получим соотношения

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \frac{G_1(\sigma_k)}{\sigma_k} = \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{1}{\mu_1^{l_k} \sigma_k} = \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{\lambda^{l_k}}{\sigma_k} = 0.$$

Из результатов главы 1, 2 данной работы следует, что по заранее заданным последовательностям  $\sigma_k, \varepsilon_k$  можно найти последовательность  $l_k$ , удовлетворяющую условиям (3.12), достаточно быстро стремящуюся к бесконечности, и построить непрерывно дифференцируемую функцию  $G_1$ , удовлетворяющую свойствам (3.14), (3.15). Более того, эта функция может иметь в нуле производную второго порядка равную нулю. Функции  $G_2, \dots, G_n$ , удовлетворяющие свойствам (3.14), (3.15), также могут быть построены.

Определим элементы еще одной числовой последовательности как

$$\delta_k = \max \left[ 2\lambda^{l_k} \sigma_k, 4n(\|B\| + \bar{M}) \lambda^{l_k} \varepsilon_k \right].$$

Пусть

$$U_k = \{(x, y) : \|x - x_k\| < \delta_k, |y_1 - y_1^k| < \varepsilon_k, |y_i - y_i^k| < \Delta_i^k, i = 2, \dots, n\}.$$

Ясно, что для достаточно больших номеров  $k$  справедливы включения

$$U_k \subset U \subset V_1, L(U_k) \subset L(U) \subset V_1. \quad (3.16)$$

Имеет место следующая лемма.

**Лемма 3.1.** Пусть выполнены условия (3.1)-(3.16), тогда для достаточно больших номеров  $k$  справедливы включения

$$f^{l_k} L(\bar{U}_k) \subset U_k, \quad (3.17)$$

где  $\bar{U}_k$  замыкание  $U_k$ .

**Доказательство.** Ясно, что при выполнении условий (3.16) имеют место включения

$$f^j L(\bar{U}_k) \subset V_1, j = 0, 1, \dots, l_k.$$

Пусть

$$\begin{pmatrix} \bar{x}_k \\ \bar{y}_k \end{pmatrix} = f^{l_k} L \begin{pmatrix} x_k \\ y_k \end{pmatrix}.$$

Легко видеть, что

$$\begin{aligned} \bar{x}_k &= x_k + \Lambda^{l_k} \Phi(x_k, \xi_k), \\ \bar{y}_k &= y_k + M^{l_k} (\tau_k + \Psi(x_k, \xi_k)), \end{aligned} \quad (3.18)$$

причем

$$\begin{aligned} \bar{x}_k &= \text{col}(\bar{x}_1^k, \dots, \bar{x}_m^k), \\ \bar{y}_k &= \text{col}(\bar{y}_1^k, \dots, \bar{y}_n^k). \end{aligned}$$

Пусть  $\theta^1, u$  – произвольные  $m$ -мерные векторы, а  $\theta^2, v$  – произвольные  $n$ -мерные векторы. Введем обозначения  $\theta^1 u, \theta^2 v$

$$\theta^1 u = \text{col}(\theta_1^1 u_1, \dots, \theta_m^1 u_m), \theta^2 v = \text{col}(\theta_1^2 v_1, \dots, \theta_n^2 v_n).$$



$U$  – выпуклая окрестность точки  $(0, y^0)$ , поэтому, применив теорему о среднем значении, получим

$$\Phi(x_k, \xi_k) = \frac{\partial \Phi(\theta^1 x_k, \theta^2 \xi_k)}{\partial x} x_k + \frac{\partial \Phi(\theta^1 x_k, \theta^2 \xi_k)}{\partial y} \xi_k.$$

Известно, что элементы векторов  $\theta^1, \theta^2$  зависят от  $k$ , но при этом ограничены, точнее, они принадлежат промежутку  $[0, 1]$  при любых  $k$ .

Из свойств функции  $\Phi$  следует

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \left\| \frac{\partial \Phi(\theta^1 x_k, \theta^2 \xi_k)}{\partial x} \right\| = \lim_{k \rightarrow \infty} \left\| \frac{\partial \Phi(\theta^1 x_k, \theta^2 \xi_k)}{\partial y} \right\| = 0.$$

Из последних соотношений, условий (3.13), определения  $x_k, \xi_k$  получим, что при достаточно больших номерах  $k$  справедливы неравенства

$$\begin{aligned} \left\| \frac{\partial \Phi(\theta^1 x_k, \theta^2 \xi_k)}{\partial x} \right\| &\leq (4 \|x^0\|)^{-1}, \\ \left\| \frac{\partial \Phi(\theta^1 x_k, \theta^2 \xi_k)}{\partial y} \right\| &\leq 0.25, \\ \|x_k\| &\leq 2\lambda^k \|x^0\|, \\ \|\xi_k\| &\leq 2\sigma_k, \\ \lambda^k &< \sigma_k, \end{aligned}$$

откуда, учитывая (3.18), получим

$$\|\bar{x}_k - x_k\| \leq \|\Lambda^k\| \|\Phi(x_k, \xi_k)\| < \lambda^k \sigma_k \leq 0.5\delta. \quad (3.19)$$

Аналогично, применив теорему о среднем значении к функции  $\Psi$ , получим

$$\Psi(x_k, \xi_k) = \frac{\partial \Psi(\theta^1 x_k, \theta^2 \xi_k)}{\partial x} x_k + \frac{\partial \Psi(\theta^1 x_k, \theta^2 \xi_k)}{\partial y} \xi_k,$$

где элементы векторов  $\theta^1, \theta^2$  удовлетворяют вышеуказанным свойствам, поэтому

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \left\| \frac{\partial \Psi(\theta^1 x_k, \theta^2 \xi_k)}{\partial x} \right\| = \lim_{k \rightarrow \infty} \left\| \frac{\partial \Psi(\theta^1 x_k, \theta^2 \xi_k)}{\partial y} \right\| = 0.$$

Учитывая условия (3.8) и определение вектора  $\xi_k$ , получим

$$\Psi_i(x_k, \xi_k) = \sum_{j=1}^m \frac{\partial \Psi_i(\theta^1 x_k, \theta^2 \xi_k)}{\partial x_j} x_j^k + \sum_{s=i+1}^n \frac{\partial \Psi_i(\theta^1 x_k, \theta^2 \xi_k)}{\partial y_s} \xi_s^k,$$

$$i = 1, 2, \dots, n.$$

Из равенств (3.18) следует оценка

$$|y_i^k - \bar{y}_i^k| \leq \mu_i^{l_k} |\tau_i^k| + \mu_i^{l_k} |\Psi_i(x_k, \xi_k)|,$$

$$i = 1, 2, \dots, n,$$

откуда, принимая во внимание неравенства (3.13), имеем

$$|y_i^k - \bar{y}_i^k| < 0.25 \Delta_i^k + (\lambda \mu_i)^{l_k},$$

$$i = 1, 2, \dots, n.$$

Из неравенств (3.12) и определения  $\Delta_i^k$  следует

$$(\lambda \mu_i)^{l_k} < 0.25 \Delta_i^k,$$

откуда

$$|\bar{y}_i^k - y_i^k| < 0.5 \Delta_i^k,$$

$$i = 1, 2, \dots, n.$$

Последние неравенства и соотношения (3.19) означают, что имеют место следующие включения (для достаточно больших номеров  $k$ )

$$(\bar{x}_k, \bar{y}_k) \in U_k.$$

Пусть  $(x, y) \in \bar{U}_k$ , тогда представим  $x, y$  как

$$x = x_k + u,$$

$$y = y_k + v,$$

где

$$\begin{aligned} u &= \text{col}(u_1, \dots, u_m), \\ \|u\| &\leq \delta_k, \\ v &= \text{col}(v_1, \dots, v_n), \\ |v_i| &\leq \Delta_i^k, i = 1, 2, \dots, n. \end{aligned}$$

Пусть

$$\begin{pmatrix} \bar{x} \\ \bar{y} \end{pmatrix} = f^{l_k} L \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix},$$

легко видеть, учитывая (3.18), что

$$\begin{aligned} \bar{x} &= \bar{x}_k + \Lambda^{l_k} (Au + Bv + \Phi(x_k + u, \xi_k + v) - \Phi(x_k, \xi_k)), \\ \bar{y} &= \bar{y}_k + M^{l_k} (Cu + Sv + G(\xi_k + v) - G(\xi_k) + \Psi(x_k + u, \xi_k + v) - \Psi(x_k, \xi_k)). \end{aligned} \quad (3.20)$$

В дальнейшем через  $\bar{y}_j, j = 1, 2, \dots, n$ , обозначаются координаты вектора  $\bar{y}$ .

Применив теорему о среднем значении к разности  $\Phi(x_k + u, \xi_k + v) - \Phi(x_k, \xi_k)$ , также учитывая неравенства (3.9), легко получить, что при достаточно больших номерах  $k$ , справедливы неравенства

$$\begin{aligned} &\|\Phi(x_k + u, \xi_k + v) - \Phi(x_k, \xi_k)\| \leq \\ &\leq \left\| \frac{\partial \Phi(x_k + \theta^1 u, \xi_k + \theta^2 v)}{\partial x} \right\| \|u\| + \left\| \frac{\partial \Phi(x_k + \theta^1 u, \xi_k + \theta^2 v)}{\partial y} \right\| \|v\|, \end{aligned}$$

где  $\theta^1, \theta^2$  – векторы размерности  $m$  и  $n$  соответственно, элементы которых лежат между 0 и 1 при любом  $k$ . Очевидно, что справедливо следующее включение

$$(x_k + \theta^1 u, y_k + \theta^2 v) \in U_k,$$

поэтому, учитывая (3.9), имеем

$$\|\Phi(x_k + u, \xi_k + v) - \Phi(x_k, \xi_k)\| \leq \bar{M} (\delta_k + \varepsilon_k),$$

откуда

$$\|\bar{x} - \bar{x}_k\| \leq \lambda^k \left[ (\|A\| + \bar{M}) \delta_k + (\|B\| + \bar{M}) \varepsilon_k \right] < 0.5 \delta_k.$$

Таким образом, имеем

$$\|\bar{x} - x_k\| \leq \|\bar{x} - \bar{x}_k\| + \|\bar{x}_k - x_k\| < \delta_k. \quad (3.21)$$

Проведем аналогичные оценки для величин  $|\bar{y}_i - \bar{y}_i^k|$ , где  $i = 1, 2, \dots, n$ , для этого рассмотрим равенства

$$\begin{aligned} \bar{y}_1 &= \bar{y}_1^k + \mu_1^k \left[ C_1 u + S_1 v + G_1(\sigma_k + v_1) - G_1(\sigma_k) \right] + \\ &+ \mu_1^k \left[ \Psi_1(x_k + u, \xi_2^k + v_2, \dots, \xi_n^k + v_n) - \Psi_1(x_k, \xi_2^k, \dots, \xi_n^k) \right], \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \bar{y}_i &= \bar{y}_i^k + \mu_i^k \left[ C_i u + S_i v + G_i(\sigma_k + v_1, \xi_2^k + v_2, \dots, \xi_i^k + v_i) - G_i(\sigma_k, \xi_2^k, \dots, \xi_i^k) \right] + \\ &+ \mu_i^k \left[ \Psi_i(x_k + u, \xi_{i+1}^k + v_{i+1}, \dots, \xi_n^k + v_n) - \Psi_i(x_k, \xi_{i+1}^k, \dots, \xi_n^k) \right]. \end{aligned}$$

Применим теорему о среднем значении к разностям

$$G_i(\xi_k + v) - G_i(\xi_k), \quad \Psi_i(x_k + u, \xi_k + v) - \Psi_i(x_k, \xi_k),$$

при достаточно больших номерах  $k$ , получим

$$G_i(\xi_k + v) - G_i(\xi_k) = \sum_{j=1}^i \frac{\partial G_i}{\partial y_j}(\xi_k + \theta^2 v) v_j,$$

$$\begin{aligned} &\Psi_i(x_k + u, \xi_k + v) - \Psi_i(x_k, \xi_k) = \\ &= \sum_{j=1}^m \frac{\partial \Psi_i}{\partial x_j}(x_k + \theta^1 u, \xi_k + \theta^2 v) u_j + \sum_{s=i+1}^n \frac{\partial \Psi_i}{\partial y_s}(x_k + \theta^1 u, \xi_k + \theta^2 v) v_s, \end{aligned}$$

откуда, с учетом условий (3.9), (3.15), имеем

$$\begin{aligned} |G_i(\xi_k + v) - G_i(\xi_k)| &\leq \mu^{-\alpha k} n \Delta_1^k, \\ |\Psi_i(x_k + u, \xi_k + v) - \Psi_i(x_k, \xi_k)| &\leq \bar{M} m \delta_k + \bar{M} n \Delta_{i+1}^k. \end{aligned}$$

Из последних неравенств, определения вектора  $\bar{y}$  и условий (3.19) следует

$$|\bar{y}_i - \bar{y}_i^k| \leq \mu_i^k \left[ (\|C\| + \bar{M}m) \delta_k + (\|S\| + \bar{M}n) \Delta_{i+1}^k + \mu^{-\alpha k} \Delta_1^k n \right],$$

где  $i = 1, 2, \dots, n$ , откуда следует неравенство

$$|\bar{y}_i - \bar{y}_i^k| < 0.5 \Delta_i^k.$$

Окончательно,

$$|\bar{y}_i - y_i^k| \leq |\bar{y}_i - \bar{y}_i^k| + |\bar{y}_i^k - y_i^k| < \Delta_i^k, i = 1, 2, \dots, n.$$

Из последних неравенств и неравенств (3.21) следуют включения (3.17).

Лемма 3.1 доказана.

**Теорема 3.1.** Пусть  $f$  – диффеоморфизм  $(m+n)$ -мерного пространства в себя с неподвижной гиперболической точкой в начале координат, предположим, что существует нетрансверсальная гомоклиническая к ней точка. Пусть выполнены условия (3.1)-(3.16), тогда окрестность точки  $(0, y^0)$  содержит счетное множество устойчивых периодических точек диффеоморфизма  $f$ , характеристические показатели которых отделены от нуля.

**Доказательство.** Для достаточно больших номеров  $k$  справедливы включения (3.17), следовательно, в  $U_k$  лежит неподвижная точка отображения  $f^k L$ . Пусть  $r_k = (x_k^*, y_k^*)$  – такие неподвижные точки, кроме того, пусть

$$\Xi_k = Df^k L \begin{pmatrix} x_k^* \\ y_k^* \end{pmatrix}.$$

Введем обозначения

$$\begin{aligned} A_k &= A + \frac{\partial \Phi(x_k^*, y_k^* - y^0)}{\partial x}, \\ B_k &= B + \frac{\partial \Phi(x_k^*, y_k^* - y^0)}{\partial y}, \\ C_k &= C + \frac{\partial \Psi(x_k^*, y_k^* - y^0)}{\partial x}, \\ S_k &= S + \frac{\partial \Psi(x_k^*, y_k^* - y^0)}{\partial y}, \\ G_k &= \frac{\partial G(y_k^* - y^0)}{\partial y}. \end{aligned}$$

Ясно, что

$$\Xi_k = \begin{pmatrix} \Lambda^{l_k} & \mathbf{O} \\ \mathbf{O} & M^{l_k} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A_k & B_k \\ C_k & G_k + S_k \end{pmatrix}. \quad (3.22)$$

Пусть  $s_{ij}(k), g_{ij}(k)$  – элементы матриц  $S_k, G_k$  соответственно. Из условий (3.6), (3.8), (3.10), (3.15) имеем

$$\begin{aligned} s_{ij}(k) &= 0, i \geq j, \\ g_{ij}(k) &= 0, i < j, \\ |g_{ij}(k)| &< \mu^{-\alpha l_k}, i \geq j. \end{aligned} \quad (3.23)$$

При любом фиксированном  $k$  рассмотрим характеристическое уравнение матрицы  $\Xi_k$ . Пусть  $\chi(\rho)$  – характеристический многочлен матрицы, тогда уравнение  $\chi(\rho) = 0$  является характеристическим уравнением матрицы.

Пусть

$$\chi(\rho) = \sum_{j=0}^{n+m} (-1)^{n+m-j} \gamma_j \rho^{n+m-j}, \quad (3.24)$$

где  $\gamma_0 = 1$ .

Известно, что коэффициенты характеристического многочлена матрицы (при  $i = 1, 2, \dots, n+m$ ) представляют собой сумму всех возможных главных миноров соответствующего порядка. (Главным минором матрицы называется такой минор, у которого номера выбранных строк совпадают с номерами выбранных столбцов, а именно, любому фиксированному набору из  $i$  строк матрицы, где  $1 \leq i \leq m+n$ , соответствует единственный набор столбцов с такими же номерами. На пересечении этих строк и столбцов лежат элементы матрицы, которые представляют собой главный минор матрицы порядка  $i$ ).

Ясно, что любой главный минор порядка  $i$ , как сумма произведений элементов матрицы, имеет в качестве одного слагаемого произведение из  $i$  элементов главной диагонали матрицы. Очевидно, что все главные миноры матрицы  $S$  равны нулю. В дальнейшем через  $\theta_i$  обозначается произвольный главный минор матрицы  $\Xi_k$  порядка  $i$ .

Ясно, что

$$\gamma_i = \sum_{(i)} \theta_i \tag{3.25}$$

где  $\theta_i$  – главный минор матрицы  $\Xi_k$  порядка  $i$ . Суммирование в последней сумме ведется по всем возможным наборам из  $i$  номеров, выбранным из последовательности  $1, 2, \dots, n+m$ . Ясно, что число слагаемых в этой сумме равно  $C_{n+m}^i$  (числу сочетаний). Очевидно, что

$$\begin{aligned} \gamma_1 &= \text{Tr} \Xi_k = \text{Tr}(\Lambda^k A_k) + \text{Tr}(M^k G_k), \\ \gamma_{n+m} &= \det \Xi_k > 0. \end{aligned}$$

Пусть  $i \leq n$ , выберем  $i$  строк матрицы  $\Xi_k$  таким образом, чтобы  $m+1 \leq t_1 < t_2 < \dots < t_i \leq m+n$ , где через  $t_j$  обозначены номера выбранных строк. Пусть  $\theta_i$  – соответствующий главный минор, ясно, что этот минор

является главным минором матрицы  $M^{l_k}(G_k + S_k)$ . Очевидно, что указанная матрица имеет вид

$$M^{l_k}(G_k + S_k) = M^{l_k} \begin{pmatrix} g_{11}(k) & s_{12}(k) & s_{13}(k) & \dots & s_{1n}(k) \\ g_{21}(k) & g_{22}(k) & s_{23}(k) & \dots & s_{2n}(k) \\ \cdot & \cdot & \cdot & \dots & \cdot \\ g_{n-11}(k) & g_{n-12}(k) & g_{n-13}(k) & \dots & s_{n-1n}(k) \\ g_{n1}(k) & g_{n2}(k) & g_{n3}(k) & \dots & g_{nn}(k) \end{pmatrix},$$

а ее главный минор порядка  $i$  записывается как

$$\theta_i = \begin{vmatrix} \mu_{t_1}^{l_k} g_{t_1 t_1}(k) & \mu_{t_1}^{l_k} s_{t_1 t_2}(k) & \dots & \mu_{t_1}^{l_k} s_{t_1 t_i}(k) \\ \mu_{t_2}^{l_k} g_{t_2 t_1}(k) & \mu_{t_2}^{l_k} g_{t_2 t_2}(k) & \dots & \mu_{t_2}^{l_k} s_{t_2 t_i}(k) \\ \cdot & \cdot & \dots & \cdot \\ \mu_{t_i}^{l_k} g_{t_i t_1}(k) & \mu_{t_i}^{l_k} g_{t_i t_2}(k) & \dots & \mu_{t_i}^{l_k} g_{t_i t_i}(k) \end{vmatrix}.$$

Известно, что каждое слагаемое определителя имеет в качестве сомножителя ровно один элемент своей последней строки, поэтому, учитывая соотношения (3.22), легко видеть, что минор  $\theta_i$  можно представить как

$$\theta_i = (\mu_{n-i+1} \dots \mu_n \mu^{-\alpha})^{l_k} R_i(k),$$

где  $R_i(k)$  ограничены при любых номерах  $k$ .

В случае если минор  $\theta_i$  не является главным минором матрицы  $M^{l_k}(G_k + S_k)$ , т.е. если хотя бы один номер выбранной строки матрицы  $\Xi_k$  не превосходит  $m$ , тогда хотя бы одна из строк минора составлена из элементов строки матрицы  $(\Lambda^{l_k} A_k, \Lambda^{l_k} B_k)$ , поэтому такой минор можно записать как

$$\theta_i = (\lambda \mu_{n-i+2} \dots \mu_n)^{l_k} H_i(k),$$

где  $H_i(k)$  ограничены при любых  $k$ .



Окончательно, пусть  $i \leq n$ , тогда соответствующий коэффициент характеристического многочлена  $\chi(\rho)$  представим как

$$\gamma_i = (\mu_{n-i+1} \dots \mu_n \mu^{-\alpha})^{l_k} P_i(k) + (\lambda \mu_{n-i+2} \dots \mu_n)^{l_k} Q_i(k), \quad (3.26)$$

где  $P_i(k), Q_i(k)$  ограничены по  $k$ .

Аналогично, пусть  $n < i \leq n+m$ , тогда, очевидно, что хотя бы одна строка этого минора составлена из элементов строки матрицы  $(\Lambda^{l_k} A_k; \Lambda^{l_k} B_k)$ , поэтому, такой минор можно записать как

$$\theta_i = (\lambda_{m+n-i+1} \dots \lambda_m \mu)^{l_k} H_i(k),$$

где  $H_i(k)$  ограничены при любых  $k$ .

Аналогично, при  $n < i \leq n+m$ , соответствующий коэффициент характеристического многочлена представим как

$$\gamma_i = (\lambda_{n+m-i+1} \dots \lambda_m \mu)^{l_k} Q_i(k), \quad (3.27)$$

где  $Q_i(k)$  ограничены по  $k$ .

Из свойств характеристического многочлена и условий (3.26), (3.27) имеем

$$\gamma_1 = (\mu_n \mu^{-\alpha})^{l_k} P_1(k) + \lambda^{l_k} Q_1(k),$$

где  $P_1(k), Q_1(k)$  ограничены,

$$\gamma_{n+m} = (\lambda_1 \dots \lambda_m \mu)^{l_k} Q_{n+m}(k),$$

где

$$\lim_{k \rightarrow \infty} Q_{n+m}(k) = \det DL(0) > 0.$$

С другой стороны, пусть  $\rho_1, \rho_2, \dots, \rho_{n+m}$  – корни характеристического многочлена  $\chi(\rho)$ , заметим, что среди этих величин могут быть одинаковые и комплексные. Запишем  $\chi(\rho)$  как

$$\chi(\rho) = (-1)^{n+m} \prod_{i=1}^{n+m} (\rho - \rho_i) = \sum_{i=0}^{n+m} (-1)^{n+m-i} \rho^{n+m-i} \sum_{(i)} \rho_{t_1} \rho_{t_2} \dots \rho_{t_i},$$

откуда

$$\gamma_i = \sum_{(i)} \rho_{t_1} \rho_{t_2} \dots \rho_{t_i}, \quad (3.28)$$

суммирование ведется по всем возможным наборам индексов  $t_1, t_2, \dots, t_i$ , выбранным из конечной последовательности индексов  $1, 2, \dots, n+m$ . Ясно, что число слагаемых в сумме, стоящей в правой части формулы (3.25), равно  $C_{n+m}^i$  (числу сочетаний).

Очевидно, что корни  $\chi(\rho)$  зависят от  $k$ .

Известно, что среди корней могут быть кратные и комплексно сопряженные, таким образом, среди слагаемых суммы (3.28) могут быть комплексные слагаемые с ненулевой мнимой частью, однако, из рассуждений ясно, что коэффициенты  $\chi(\rho)$  являются действительными величинами при любых  $k$ , поэтому при любом  $i$  коэффициенты  $\gamma_i$  являются действительными величинами.

Пусть  $w = (n+m)^{-1}$ .

Предположим, что

$$1 < \alpha < 1 - \frac{nw \ln(\lambda \mu)}{\ln \mu}, \quad (3.29)$$

где величина  $\alpha$  была введена в (3.15).

Покажем, что тогда существует положительная постоянная  $T$ , не зависящая от  $k$ , такая, что

$$|\rho_i(k)| \leq T \mu^{-(\alpha-1)n^{-1}l_k}, \quad i = 1, 2, \dots, n+m, \quad (3.30)$$

где  $\rho_i(k)$  – корни характеристического многочлена.

Неравенства (3.30) докажем от противного, т.е. предположим, что они не выполняются для бесконечного числа индексов  $k$ , точнее, существуют

подпоследовательность индексов  $k_s \left( \lim_{s \rightarrow \infty} k_s = +\infty \right)$  и последовательность номеров  $j_s, 1 \leq j_s \leq n + m$ , таких, что

$$\begin{aligned} \rho_{j_s}(k_s) &= \Gamma(k_s) \mu^{-(\alpha-1)n^{-1}l_{k_s}}, \\ \lim_{s \rightarrow \infty} |\Gamma(k_s)| &= +\infty. \end{aligned}$$

Для простоты последующих рассуждений, предположим, что  $k_s = k, j_s = 1$  для любого  $k$ , тогда получим

$$\begin{aligned} \rho_1(k) &= \Gamma(k) \mu^{-(\alpha-1)n^{-1}l_k}, \\ \lim_{k \rightarrow \infty} |\Gamma(k)| &= +\infty. \end{aligned} \tag{3.31}$$

Покажем, что из равенств (3.31) следует

$$\begin{aligned} \rho_1 \sum_{(i)} \rho_{t_2} \rho_{t_3} \dots \rho_{t_i} &= \Gamma_i(k) \mu^{-(\alpha-1)n^{-1}l_k}, i = 2, 3, \dots, n + m, \\ \lim_{k \rightarrow \infty} |\Gamma_i(k)| &= +\infty, \end{aligned} \tag{3.32}$$

где  $t_2, t_3, \dots, t_i$  – произвольный набор индексов, выбранный из конечной последовательности индексов  $2, 3, \dots, n + m$ , а суммирование ведется по всем возможным указанным наборам, ясно, что число слагаемых в сумме равно  $C_{n+m-1}^{i-1}$ .

Докажем равенства (3.32) по индукции. Учитывая предположения (3.31), получим

$$\begin{aligned} \gamma_1 - \rho_1 &= \\ &= \sum_{i=2}^{n+m} \rho_i = \mu^{-(\alpha-1)n^{-1}l_k} \left[ \left( \mu_n \mu^{-\alpha} \mu^{(\alpha-1)n^{-1}} \right)^{l_k} P_1(k) + \left( \lambda \mu^{(\alpha-1)n^{-1}} \right)^{l_k} Q_1(k) - \Gamma(k) \right]. \end{aligned} \tag{3.33}$$

Кроме того, из условия (3.29) следует

$$\begin{aligned} \mu_n \mu^{-\alpha} \mu^{(\alpha-1)n^{-1}} &\leq \mu^{-(\alpha-1)} \mu^{(\alpha-1)n^{-1}} \leq 1, \\ \lambda \mu^{(\alpha-1)n^{-1}} &< \lambda (\lambda \mu)^{-w} = \lambda^{1-w} \mu^{-w} < 1, \end{aligned}$$

таким образом, представим

$$\sum_{i=2}^{n+m} \rho_i = \mu^{-(\alpha-1)n^{-1}l_k} \bar{\Gamma}_1(k),$$

где  $\bar{\Gamma}_1(k)$  определяется равенствами (3.33), причем

$$\lim_{k \rightarrow \infty} |\bar{\Gamma}_1(k)| = +\infty.$$

В результате

$$\rho_1 \sum_{i=2}^{n+m} \rho_i = \Gamma(k) \bar{\Gamma}_1(k) \mu^{-(\alpha-1)n^{-1}2l_k}.$$

Пусть

$$\Gamma_2(k) = \Gamma(k) \bar{\Gamma}_1(k),$$

ясно, что

$$\lim_{k \rightarrow \infty} |\Gamma_2(k)| = +\infty,$$

из последнего соотношения следует равенство (3.32) при  $i = 2$ .

База индукции установлена, перейдем к доказательству индукционного перехода. Пусть  $i \leq n$ , из равенств (3.28) имеем

$$\gamma_i - \rho_1 \sum_{(i)} \rho_{t_2} \dots \rho_{t_i} = \sum_{(i), t_i > 1} \rho_{t_1} \rho_{t_2} \dots \rho_{t_i}, \quad (3.34)$$

в левой части последних равенств суммирование ведется по всем возможным наборам из  $i-1$  индекса, выбранным из конечной последовательности номеров  $2, 3, \dots, n+m$ , в правой части – по всем возможным наборам из  $i$  индексов, выбранным из той же конечной последовательности номеров. Из условий (3.26) имеем

$$\begin{aligned} & \gamma_i - \rho_1 \sum_{(i)} \rho_{t_2} \dots \rho_{t_i} = \\ & = \mu^{-(\alpha-1)n^{-1}i l_k} \left[ \left( \mu_{n-i+1} \dots \mu_n \mu^{-\alpha} \mu^{(\alpha-1)n^{-1}i} \right)^{l_k} P_i(k) + \left( \lambda \mu_{n-i+2} \dots \mu_n \mu^{(\alpha-1)n^{-1}i} \right)^{l_k} Q_i(k) - \Gamma_i(k) \right]. \end{aligned} \quad (3.35)$$

Кроме того, учитывая (3.29), получим

$$\begin{aligned} \mu_{n-i+1} \dots \mu_n \mu^{-\alpha} \mu^{(\alpha-1)n^{-1}i} & \leq \mu^{-(\alpha-1)} \mu^{(\alpha-1)n^{-1}i} \leq 1, \\ \lambda \mu_{n-i+2} \dots \mu_n \mu^{(\alpha-1)n^{-1}i} & \leq \lambda \mu (\lambda \mu)^{-wi} = (\lambda \mu)^{1-wi} < 1. \end{aligned}$$

В результате имеем

$$\sum_{(i), t_1 > 1} \rho_{t_1} \rho_{t_2} \dots \rho_{t_i} = \mu^{-(\alpha-1)n^{-1}i k} \bar{\Gamma}_i(k),$$

где  $\bar{\Gamma}_i(k)$  определяется равенствами (3.35). Ясно, что

$$\lim_{k \rightarrow \infty} |\bar{\Gamma}_i(k)| = +\infty,$$

пусть

$$\Gamma_{i+1}(k) = \Gamma(k) \bar{\Gamma}_i(k),$$

тогда

$$\rho_1 \sum_{(i), t_1 > 1} \rho_{t_1} \rho_{t_2} \dots \rho_{t_i} = \mu^{-(\alpha-1)n^{-1}(i+1)k} \Gamma_{i+1}(k), \quad (3.36)$$

причем

$$\lim_{k \rightarrow \infty} |\Gamma_{i+1}(k)| = +\infty.$$

Таким образом, равенства (3.29) доказаны, для случая  $i \leq n+1$ .

Докажем индукционный переход при  $n+1 \leq i < n+m$ . Из предположения (3.31) имеем

$$\begin{aligned} \gamma_i - \rho_1 \sum_{(i)} \rho_{t_2} \dots \rho_{t_i} &= \sum_{(i), t_1 > 1} \rho_{t_1} \rho_{t_2} \dots \rho_{t_i} = \\ &= \mu^{-(\alpha-1)n^{-1}i k} \left[ \left( \lambda_{n+m-i+1} \dots \lambda_m \mu^{1+(\alpha-1)n^{-1}i} \right)^k Q_i(k) - \Gamma_i(k) \right], \end{aligned}$$

из неравенства (3.29) имеем

$$\lambda_{n+m-i+1} \dots \lambda_m \mu^{1+(\alpha-1)n^{-1}i} \leq (\lambda \mu)^{1-wi} \leq 1,$$

из равенств (3.35) получим

$$\sum_{(i), t_1 > 1} \rho_{t_1} \rho_{t_2} \dots \rho_{t_i} = \mu^{-(\alpha-1)n^{-1}i k} \bar{\Gamma}_i(k),$$

где  $\bar{\Gamma}_i(k)$  определяется последними равенствами, кроме того,

$$\lim_{k \rightarrow \infty} |\bar{\Gamma}_i(k)| = +\infty.$$

Окончательно, учитывая предположения (3.31), определения (3.35), получим равенства (3.36), которые доказывают индукционный переход и в этом случае.

Пусть  $i = m+n$ , тогда равенства (3.32) имеют вид

$$\rho_1 \rho_2 \dots \rho_{m+n} = \mu^{-(\alpha-1)(mw)^{-1}k} \Gamma_{m+n}(k),$$

где

$$\lim_{k \rightarrow \infty} |\Gamma_{m+n}(k)| = +\infty,$$

с другой стороны

$$\rho_1 \rho_2 \dots \rho_{m+n} = (\lambda_1 \dots \lambda_m \mu)^k Q_{m+n}(k),$$

следовательно,

$$\Gamma_{m+n}(k) = \left( \lambda_1 \dots \lambda_m \mu^{1+(\alpha-1)(mw)^{-1}} \right)^k Q_{m+n}(k),$$

из неравенства (3.29) имеем

$$\left( \lambda_1 \dots \lambda_m \mu^{1+(\alpha-1)(mw)^{-1}} \right) \leq 1,$$

таким образом, получаем, что  $\Gamma_{m+n}(k)$  ограничены по  $k$ . Следовательно, получено противоречие, которое показывает, что предположения (3.31) не справедливы. Таким образом, доказаны неравенства (3.30).

Известно, что характеристические показатели периодических точек  $r_k$  диффеоморфизма  $f$  определяются как

$$\begin{aligned} \nu_i(k) &= (\kappa + l_k)^{-1} \ln |\rho_i(k)|, \\ i &= 1, 2, \dots, m+n, \end{aligned} \tag{3.37}$$

где натуральная величина  $k$  определена ранее, а  $\rho_i(k)$ ,  $i = 1, 2, \dots, m+n$ , – корни характеристического многочлена  $\chi(\rho)$ . Из условий (3.30) имеем

$$\nu_i(k) \leq (\kappa + l_k)^{-1} \left[ \ln T - \alpha n^{-1} l_k \ln \mu \right] \leq -\frac{\alpha}{2n} \ln \mu,$$

$$i = 1, 2, \dots, m+n,$$

последние неравенства справедливы для всех номеров  $k$ , начиная с некоторого номера. Теорема, в случае выполнения неравенства (3.29), доказана.

Предположим, что неравенство (3.29) неверно, тогда

$$\alpha \geq 1 - \frac{nw \ln(\lambda\mu)}{\ln \mu} \quad (3.38)$$

или

$$\mu^{\alpha-1} (\lambda\mu)^{nw} \geq 1.$$

Покажем, что при выполнении условия (3.38), существует постоянная величина  $D$ , не зависящая от  $k$ , такая, что

$$|\rho_i| \leq D(\lambda\mu)^{wl_k}, \quad (3.39)$$

где  $i = 1, \dots, n+m$ .

Доказательство условий (3.39) аналогично доказательству условий (3.30), а именно, предположим, что утверждение неверно, тогда существуют подпоследовательность индексов  $k_s \left( \lim_{s \rightarrow \infty} k_s = +\infty \right)$  и последовательность номеров  $j_s, 1 \leq j_s \leq n+m$ , такие, что

$$\begin{aligned} \rho_{j_s}(k_s) &= \Theta(k_s)(\lambda\mu)^{wl_{k_s}}, \\ \lim_{s \rightarrow \infty} |\Theta(k_s)| &= +\infty. \end{aligned}$$

Для простоты последующих рассуждений, предположим, что  $s_k = k, j_s = 1$  для любого  $k$ , тогда получим

$$\begin{aligned} \rho_1(k) &= \Theta(k)(\lambda\mu)^{wl_k}, \\ \lim_{k \rightarrow \infty} |\Theta(k)| &= +\infty. \end{aligned} \quad (3.40)$$

Покажем по индукции, что при выполнении условий (3.40) имеют место следующие соотношения

$$\rho_1 \sum_{(j)} \rho_{t_2} \dots \rho_{t_j} = \Theta_j(k)(\lambda\mu)^{jwl_k}, \quad (3.41)$$

где  $\Theta_j(k)$  таковы, что

$$\lim_{k \rightarrow \infty} |\Theta_j(k)| = +\infty, \quad j = 2, \dots, n+m.$$

Суммирование в (3.41) ведется по всем возможным наборам из  $j-1$  индекса, выбранным из набора  $(2, 3, \dots, m+n)$   $C_{n+m-1}^{j-1}$  способами, при этом предполагается, что  $t_2 < \dots < t_j$ .

Установим базу индукции. Аналогично равенствам (3.33) легко получить, учитывая (3.40),

$$\gamma_1 - \rho_1 = \sum_{i=2}^{n+m} \rho_i = (\lambda\mu)^{wk} \left[ \left( \mu_n \mu^{-\alpha} (\lambda\mu)^{-w} \right)^{l_k} P_1(k) + \left( \lambda (\lambda\mu)^{-w} \right)^{l_k} Q_1(k) - \Theta(k) \right] \quad (3.42)$$

или

$$\sum_{j=2}^{n+m} \rho_j = (\lambda\mu)^{wk} \bar{\Theta}_1(k),$$

где  $\bar{\Theta}_1(k)$  определяется из (3.42).

Из неравенств (3.3), (3.38) следует

$$\begin{aligned} \lambda (\lambda\mu)^{-w} &< 1, \\ \mu^{-(\alpha-1)} (\lambda\mu)^{-w} &\leq 1, \\ \mu_n \mu^{-1} &\leq 1. \end{aligned}$$

Из последних неравенств, следует, что  $\bar{\Theta}_1(k)$  представляет собой сумму ограниченной и бесконечно большой величины, поэтому

$$\lim_{k \rightarrow \infty} |\bar{\Theta}_1(k)| = +\infty.$$

Обозначим через

$$\Theta_2(k) = \Theta(k) \bar{\Theta}_1(k),$$

ясно, что

$$\lim_{k \rightarrow \infty} |\Theta_2(k)| = +\infty,$$



откуда

$$\rho_1 \sum_{j=2}^{n+m} \rho_j = \Theta_2(k) (\lambda\mu)^{2wl_k}.$$

База индукции доказана, установим индукционный переход.

Пусть  $1 \leq j \leq n$ , аналогично условиям (3.35) получим

$$\begin{aligned} \gamma_j - \rho_1 \sum_{(j)} \rho_{t_2} \dots \rho_{t_j} &= \\ &= (\lambda\mu)^{jwl_k} \left[ \left( \mu_{n-j+1} \dots \mu_n \mu^{-\alpha} (\lambda\mu)^{-jw} \right)^{l_k} P_j(k) + \left( \lambda \mu_{n-j+2} \dots \mu_n (\lambda\mu)^{-jw} \right)^{l_k} Q_j(k) - \Theta_j(k) \right]. \end{aligned}$$

Учитывая (3.38), получим

$$\begin{aligned} (\lambda \mu_{n-j+1} \dots \mu_n) (\lambda\mu)^{-jw} &\leq (\lambda\mu)^{1-jw} < 1, \\ (\mu_{n-j+1} \dots \mu_n) \mu^{-\alpha} (\lambda\mu)^{-jw} &\leq \mu^{-(\alpha-1)} (\lambda\mu)^{-jw} \leq 1. \end{aligned}$$

Обозначим через

$$\bar{\Theta}_j(k) = (\lambda \mu_{n-j+2} \dots \mu_n)^{l_k} (\lambda\mu)^{-jwl_k} Q_j(k) + (\mu_{n-j+1} \dots \mu_n)^{l_k} \mu^{-\alpha l_k} (\lambda\mu)^{-jwl_k} P_j(k) - \Theta_j(k),$$

ясно, что

$$\lim_{k \rightarrow \infty} |\bar{\Theta}_j(k)| = +\infty,$$

откуда

$$\rho_1 \sum_{(j), t_1 > 1} \rho_{t_1} \dots \rho_{t_j} = \Theta(k) \bar{\Theta}_j(k) (\lambda\mu)^{(j+1)wl_k}.$$

Определим

$$\Theta_{j+1}(k) = \Theta(k) \bar{\Theta}_j(k),$$

в результате, соотношение (3.41) доказано при  $1 \leq j \leq n+1$ .

Аналогично доказывается индукционный переход в случае  $n < j \leq m+n$ .

Из условий (3.27) и предположения (3.40) получим

$$\begin{aligned} \gamma_j - \rho_1 \sum_{(j)} \rho_{t_2} \dots \rho_{t_j} &= \sum_{(j), t_1 > 1} \rho_{t_1} \rho_{t_2} \dots \rho_{t_j} = \\ &= (\lambda\mu)^{jwl_k} \left[ \left( \lambda_{n+m-j+1} \dots \lambda_m \mu (\lambda\mu)^{-jw} \right)^{l_k} Q_j(k) - \Theta_j(k) \right]. \end{aligned}$$

Из условий (3.38) имеем

$$\lambda_{n+m-j+1} \dots \lambda_m \mu (\lambda \mu)^{-jw} \leq (\lambda \mu)^{1-iw} \leq 1,$$

таким образом, можно определить величины  $\bar{\Theta}_j(k), \Theta_{j+1}(k)$ , которые, в силу предположений, удовлетворяют соотношениям

$$\lim_{k \rightarrow \infty} |\bar{\Theta}_j(k)| = \lim_{k \rightarrow \infty} |\Theta_{j+1}(k)| = +\infty,$$

таким образом, доказан индукционный переход и в этом случае.

Окончательно, при  $j = m+n$  имеем

$$\rho_1 \rho_2 \dots \rho_{n+m} = \Theta_{n+m}(k) (\lambda \mu)^k,$$

где

$$\lim_{k \rightarrow \infty} |\Theta_{n+m}(k)| = +\infty.$$

С другой стороны

$$\rho_1 \rho_2 \dots \rho_{n+m} = \det \Xi_k = (\lambda_1 \dots \lambda_m \mu)^k Q_{n+m},$$

где  $Q_{n+m}$  является ограниченной по  $k$  величиной, таким образом

$$\Theta_{n+m}(k) = (\lambda_1 \dots \lambda_{m-1})^k Q_{n+m},$$

т.е.  $\Theta_{n+m}(k)$  также является ограниченной по  $k$  величиной. В результате получено противоречие, которое доказывает справедливость неравенства (3.39).

Характеристические показатели периодических точек  $r_k$  диффеоморфизма  $f$  определяются формулами (3.37). При выполнении условия (3.38), учитывая условие (3.39), получим, что

$$\nu_j \leq (l_k + \kappa)^{-1} [\ln D + l_k w \ln(\lambda \mu)] \leq 0,5 w \ln(\lambda \mu),$$

последние неравенства справедливы при достаточно больших  $k$  и  $j = 1, 2, \dots, m+n$ . Эти неравенства доказывают теорему в случае выполнения условия (3.38).

Теорема 3.1 доказана.

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В диссертации изучается проблема существования бесконечного числа устойчивых периодических решений в окрестности гомоклинического решения периодической системы дифференциальных уравнений.

Рассматривается система

$$\frac{\partial z}{\partial t} = Z(t, z)$$

с  $\omega$ -периодической правой частью. Предполагается, что эта система имеет гиперболическое  $\omega$ -периодическое решение и устойчивое и неустойчивое многообразия этого решения пересекаются нетрансверсально, таким образом, существует нетрансверсальное гомоклиническое решение.

Исследуется проблема существования бесконечного числа устойчивых периодических решений в окрестности гомоклинического решения.

В диссертации получены следующие результаты:

Указан класс двумерных систем, имеющих в окрестности гомоклинической траектории бесконечно много устойчивых периодических траекторий с отделенными от нуля характеристическими показателями.

Выделен класс двумерных систем, у которых вектор-функция  $Z$  является  $r$  раз непрерывно дифференцируемой по  $z$  ( $1 < r < \infty$ ), имеющих счетное множество устойчивых периодических траекторий, лежащих в окрестности нетрансверсальной гомоклинической траектории, причем

характеристические показатели таких периодических решений отделены от нуля.

Показано, что существуют двумерные системы с бесконечно гладкой правой частью, обладающие тем же свойством.

Указаны условия, достаточные для того, чтобы многомерная система имела в окрестности нетрансверсальной гомоклинической траектории бесконечно много устойчивых периодических решений с отделенными от нуля характеристическими показателями.

Основные результаты диссертации опубликованы в научных журналах [8, 9, 13-20] и других изданиях [6, 7, 10-12].

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. *Sh. Newhouse*. Diffeomorphisms with infinitely many sinks // *Topology*. 1974. Vol.12. P.9-18.
2. *Sh. Newhouse, J. Palis, F. Takens*. Stable arcs of diffeomorphisms // *Bull. of the American Math. Society*. 1976. Vol. 82, N 3. P.499-502.
3. *Sh. Newhouse*. On Homoclinic Point // *Proc. of the American Math. Society*. 1976. Vol. 60, N 10. P.221-224.
4. *Биркгоф Г. Д.* Динамические системы. М.: Гостехиздат. 1941. 406 с.
5. *Брур Х.В., Дюмортье Ф., ван Стрин С., Такенс Ф.* Структуры в динамике. Конечномерные детерминированные системы. Москва-Ижевск: Институт компьютерных исследований. 2003. 336 с.
6. *Васильева Е.В.* Устойчивость траекторий, лежащих в окрестности гомоклинической кривой / Тезисы докладов международной конференции «Четвертые Окуневские чтения», симпозиум «Пуанкаре и проблемы нелинейной механики». СПб. 2004. С.137.
7. *Васильева Е.В.* Устойчивость траекторий в окрестности гомоклинической кривой / Тезисы докладов международной конференции «Дифференциальные уравнения и смежные вопросы». М. 2004. С.233.
8. *Васильева Е.В.* К вопросу устойчивости периодических точек, лежащих в окрестности гомоклинической кривой // Доклады Академии наук. 2005. Т. 400, № 2. С.151-152.
9. *Васильева Е.В.* Устойчивые периодические точки двумерных диффеоморфизмов класса  $C^1$  // Вестник Санкт-Петербургского университета. Сер.1. 2007. Вып.2. С.20-26.
10. *Васильева Е.В.* Устойчивые периодические точки гладких диффеоморфизмов с гомоклинической точкой / Тезисы докладов международного конгресса «Нелинейный динамический анализ-2007». СПб. 2007. С.363.

11. *Васильева Е.В.* Устойчивые периодические точки  $N$ -мерных диффеоморфизмов // Тезисы докладов международной конференции «Дифференциальные уравнения и топология». М. 2008. С.110.

12. *Васильева Е.В.* Гладкие диффеоморфизмы с бесконечным множеством устойчивых периодических точек // Дифференциальные уравнения и процессы управления. 2010. № 4. С.20-25.

13. *Васильева Е.В.* Гладкие диффеоморфизмы со счетным множеством устойчивых периодических точек // Доклады Академии наук. 2011. Т.439, № 1. С.11-13.

14. *Васильева Е.В.* Многомерные диффеоморфизмы с устойчивыми периодическими точками // Доклады Академии наук. 2011. Т.441, № 3. С.299-301.

15. *Васильева Е.В.* Диффеоморфизмы многомерного пространства с бесконечным множеством устойчивых периодических точек // Вестник Санкт-Петербургского университета. Сер.1. 2012. Вып.3. С.3-13.

16. *Васильева Е.В.* Диффеоморфизмы плоскости с устойчивыми периодическими точками // Дифференц. уравнения. 2012. Т.48, № 3. С.307-315.

17. *Васильева Е.В.* Гладкие диффеоморфизмы плоскости с устойчивыми периодическими точками, лежащими в окрестности гомоклинической точки // Дифференц. уравнения. 2012. Т. 48, № 10. С.1355-1360.

18. *Васильева Е.В.* Устойчивые периодические точки бесконечно гладких диффеоморфизмов // Доклады Академии наук. 2013. Т. 448, № 1. С.9-10.

19. *Васильева Е.В.* Гладкие диффеоморфизмы трехмерного пространства с устойчивыми периодическими точками // Вестник Санкт-Петербургского университета. Сер.1. 2013. Вып. 4. С. 25-29.

20. Васильева Е.В. Устойчивые периодические точки гладких диффеоморфизмов многомерного пространства // Вестник Удмуртского университета. Математика. Механика. Компьютерные науки. 2013. Вып. 4. С.27-35.

21. Гаврилов Н.К., Шильников Л.П. О трехмерных динамических системах, близких к системам с негрубой гомоклинической кривой. I // Матем. сб. 1972. Т.88, № 4. С.467-485.

22. Гаврилов Н.К., Шильников Л.П. О трехмерных динамических системах, близких к системам с негрубой гомоклинической кривой. II // Матем. сб. 1973. Т.90, № 1. С.139-156.

23. Гонченко В.С., Шильников Л.П. О бифуркациях систем с гомоклинической петлей к седлу-фокусу с седловым индексом  $\frac{1}{2}$  // Доклады Академии наук. 2007. Т.417, № 6. С.727-731.

24. Гонченко С.В., Шильников Л.П. О динамических системах с негрубыми гомоклиническими кривыми // ДАН СССР. 1986. Т.286, № 5. С.1049-1053.

25. Гонченко С.В., Тураев Д.В., Шильников Л.П. Динамические явления в многомерных системах с негрубой гомоклинической кривой Пуанкаре // Доклады Академии наук. 1993. Т.330, № 2. С.144-147.

26. Гонченко С.В., Шильников Л.П. Гиперболические свойства четырехмерных симплектических отображений с негрубой гомоклинической траекторией в неподвижной точке типа «седло-фокус» // Дифференц. уравнения. 2000. Т.36, № 11. С.1464-1474.

27. Иванов Б.Ф. К вопросу существования замкнутых траекторий в окрестности гомоклинической кривой // Дифференц. уравнения. 1979. Т.15, № 3. С.548-550.

28. *Иванов Б.Ф.* Устойчивость траекторий, не покидающих окрестность гомоклинической кривой // Дифференц. уравнения. 1979. Т.15, № 8. С.1409-1419.
29. *Неймарк Ю.И.* О движениях, близких к двояко-асимптотическому движению // ДАН СССР. 1967. Т.172, № 5. С.1021-1024.
30. *Нитецки З.* Введение в дифференциальную динамику. М.: Мир. 1975. 304 с.
31. *Плисс В.А.* Интегральные множества периодических систем дифференциальных уравнений. М.: Наука. 1977. 304 с.
32. *Пуанкаре А.* Новые методы небесной механики. Избранные труды. Т.1,2. М.: Наука. 1971. 772 с.
33. *Смейл С.* Диффеоморфизмы со многими периодическими точками // Математика. Сб. переводов. 1967. Т.11, № 4. С.88-106.
34. *Стенькин О.В., Шильников Л.П.* Гомоклинический  $\Omega$ -взрыв и области гиперболичности // Матем. сб. 1998. Т.189, № 4. С.125-144.
35. *Хартман Ф.* Обыкновенные дифференциальные уравнения. М.: Мир. 1970. 720 с.
36. *Шильников Л.П.* Об одной задаче Пуанкаре-Биркгофа // Матем. сб. 1967. Т.74, № 3. С.378-397.